

がん化学療法レジメン集

埼玉県済生会川口総合病院

《外科》

| | | | | | |
|---------|--------------------------|---------|----------|--------------------------|--------|
| レジメン | 乳がん EC 療法 | | | 番号 | SBR-01 |
| 適 応 | 術後補助化学療法 転移・進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エピルビシン | 75~100mg/m ² | 第 1 日 | div | 3~4 週 1 コース | |
| エンドキサン | 500~600mg/m ² | 第 1 日 | div | 術後補助の場合 4 コース | |
| レジメン | 乳がん PC 療法 | | | 番号 | SBR-03 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ピノルビン | 40mg/body | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース | |
| エンドキサン | 500mg/body | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | 乳がん weekly PTX 療法 | | | 番号 | SBR-04 |
| 適 応 | 転移・進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | 毎週繰り返し | |
| レジメン | 乳がん DOC 療法 | | | 番号 | SBR-06 |
| 適 応 | 転移・進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | 3~4 週 1 コース | |
| レジメン | 乳がん VNR 療法 | | | 番号 | SBR-07 |
| 適 応 | 進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ロゼウス | 25mg/m ² | 第 1,8 日 | div(5 分) | 3 週 1 コース | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | 乳がん FEC 療法 | | | 番号 | SBR-12 |
| 適 応 | 術後補助化学療法、転移・進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エピルビシン | 100mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| エンドキサン | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 コース繰り返す | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | 乳がん tri-weekly HER 療法 | | | 番号 | SBR-16 |
| 適 応 | (HER2 過剰発現)乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レジメン | 乳がん GEM 療法 | | | 番号 | SBR-17 |
| 適 応 | 切除不能・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1250mg/m ² | 第 1,8 日 | div | 3 週 1 コース 繰り返す | |
| レジメン | 乳がん nabPTX 療法 (tri-weekly) | | | 番号 | SBR-19 |
| 適 応 | 進行・転移・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アブラキサン | 260mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 繰り返す | |
| レジメン | 乳がん CPT-11 療法 | | | 番号 | SBR-21 |
| 適 応 | 進行・再発・手術不能乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 80mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース 繰り返す | |

| | | | | | |
|---------|--|-------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | 乳がん nabPTX+tri-weekly HER 療法 | | | 番号 | SBR-22 |
| 適 応 | 手術不能・進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | 3週1コース | |
| アブラキサン | 260mg/m ² | 第1日 | div | | |
| レジメン | 乳がん tri-weekly PTX+ tri-weekly HER 療法 | | | 番号 | SBR-23 |
| 適 応 | 進行・転移・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 210mg/m ² | 第1日 | div | 3週1コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | | |
| レジメン | 乳がん DOC+tri-weekly HER 療法 | | | 番号 | SBR-24 |
| 適 応 | 進行・転移・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 75mg/m ² | 第1日 | div | 3週1コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | | |
| レジメン | 乳がん GEM+tri-weekly HER 療法 | | | 番号 | SBR-25 |
| 適 応 | 進行・再発・切除不能乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1250mg/m ² | 第1,8日 | div | 3週1コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|------------|---|---|--------|
| レジメン | 乳がん ERI 療法 | | | 番号 | SBR-26 |
| 適 応 | 切除不能・進行再発・転移性乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エリブリン | 1.4mg/m ² | 第 1,8 日 | div | 3 週 1 コース 減量時の投与量 1.4mg/ m ² → 1.1mg/ m ² → 0.7mg/m ² →中止 | |
| レジメン | 乳がん ERI bi-weekly 療法 | | | 番号 | SBR-27 |
| 適 応 | 切除不能・進行再発・転移性乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エリブリン | 1.4mg/m ² | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース 減量時の投与量 1.4mg/ m ² → 1.1mg/ m ² → 0.7mg/m ² →中止 | |
| レジメン | 乳がん Bev+weekly PTX 療法 | | | 番号 | SBR-28 |
| 適 応 | 切除不能・進行再発・転移性乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 90mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| ベバシズマブ | 10mg/kg | 第 1,15 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | | |

| | | | | | |
|---------|--|----------|-----------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 乳がん TC 療法 | | | 番号 | SBR-29 |
| 適 応 | 乳がん術後補助化学療法 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| エンドキサン | 600mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 コース施行 | |
| レジメン | 乳がん VNR+tri-weekly HER 療法 | | | 番号 | SBR-30 |
| 適 応 | 進行・再発・切除不能乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ロゼウス | 25mg/m ² | 第 1,8 日 | div (側管から全開) | 3 週 1 コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2 回目以降) | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | 乳がん CMF 療法 | | | 番号 | SBR-31 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エンドキサン | 100mg/m ² | 第 1~14 日 | p.o. | 4 週 1 コース | |
| メトレキセート | 40mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| レジメン | 乳がん PER+HER+DOC 療法 | | | 番号 | SBR-32 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パージェタ | 840mg/body(初回のみ) 420mg/body(2 回目以降) | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2 回目以降) | 第 1 日 | div | | |
| ドセタキセル | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|--|---------|------|--|--------|
| レジメン | 乳がん tri-weeklyHER+ERI 療法 | | | 番号 | SBR-33 |
| 適 応 | 切除不能・進行再発・転移性乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エリブリン | 1.4mg/m ² | 第 1,8 日 | div | 3 週 1 コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2 回目以降) | 第 1 日 | div | エリブリン 減量時の投与量 1.4mg/ m ² → 1.1mg/ m ² → 0.7mg/ m ² →中止 | |
| レジメン | 乳がん PER+HER+nabPTX 療法 | | | 番号 | SBR-35 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パージェタ | 840mg/body(初回のみ) 420mg/body(2 回目以降) | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2 回目以降) | 第 1 日 | div | | |
| アブラキサン | 260mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | 乳がん カドサイラ療法 | | | 番号 | SBR-36 |
| 適 応 | HER2 陽性 進行再発・切除不能乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カドサイラ | 3.6mg/ kg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 減量時の投与量 3.6mg/ kg → 3.0mg/ kg → 2.4mg/ kg→中止 | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|----------|------------------------|---|--------|
| レジメン | 乳がん PER+HER 療法 | | | 番号 | SBR-37 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パージェタ | 840mg/body(初回のみ) 420mg/body(2回目以降) | 第1日 | div | 3週1コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | | |
| レジメン | 乳がん Atezo+nabPTX 療法 | | | 番号 | SBR-38 |
| 適 応 | PD-L1 陽性トリプルネガティブ乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 840mg/body | 第1,15日 | 初回 60分 2回目以降 30分 | 4週1コース | |
| アブラキサン | 100mg/m ² | 第1,8,15日 | div | | |
| レジメン | 乳がん dose-dense EC 療法 | | | 番号 | SBR-39 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エピルビシン | 90mg/m ² | 第1日 | div | 14日1コース | |
| エンドキサン | 600mg/m ² | 第1日 | div | 4コースまで PEG-G-CSF 製剤を点滴終了後、24時間後以降投与 | |
| レジメン | 乳がん dose-dense PTX 療法 | | | 番号 | SBR-40 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 第1日 | div | 14日1コース 4コースまで PEG-G-CSF 製剤を点滴終了後、24時間後以降投与 | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|--------|-----------------------|--|--------|
| レジメン | 乳がん PER+HER+S-1 療法 | | | 番号 | SBR-41 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パージェタ | 840mg/body(初回のみ) 420mg/body(2回目以降) | 第1日 | div | 3週1コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | | |
| S-1 | 80mg/m ² /日(分2) | 第1~14日 | 40mg/回 1日2回 p.o. | | |
| レジメン | 乳がん PER+HER+Cape 療法 | | | 番号 | SBR-42 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パージェタ | 840mg/body(初回のみ) 420mg/body(2回目以降) | 第1日 | div | 3週1コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | | |
| カペシタビン | 2500mg/m ² /日(分2) | 第1~14日 | 1250mg/回 1日2回 p.o. | | |
| レジメン | 乳がん エンハーツ療法 | | | 番号 | SBR-43 |
| 適 応 | HER2 陽性 進行再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エンハーツ | 5.4mg/ kg | 第1日 | div | 3週1コース 減量時の投与量 5.4mg/ kg → 4.4mg/ kg → 3.2mg/ kg → 中止 | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------|------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | 乳がん Pembro+CBDCA+PTX 療法 | | | 番号 | SBR-44 |
| 適 応 | トリプルネガティブ乳がん 術前療法 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC6 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 4 コースまで | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | CCr125mL/分まで | |
| レジメン | 乳がん Pembro+EC 療法 | | | 番号 | SBR-45 |
| 適 応 | トリプルネガティブ乳がん 術前療法 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| エピルビシン | 90mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 コースまで | |
| エンドキサン | 600mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | 乳がん Pembro 療法 (3 週間ごと) | | | 番号 | SBR-46 |
| 適 応 | トリプルネガティブ乳がん 術後療法 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | Div | 3 週 1 コース 9 コースまで | |
| レジメン | 乳がん Pembro+CBDCA+GEM 療法 | | | 番号 | SBR-47 |
| 適 応 | トリプルネガティブ進行再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC2 2×(Ccr+25)mg | 第 1,8 日 | div | CCr125mL/分まで | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------|-------|------|------------------------------------|--------|
| レジメン | (初回)フェスゴ療法 | | | 番号 | SBR-48 |
| 適 応 | HER2 陽性の乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| フェスゴ IN | 1 瓶/body | 第 1 日 | s.c | 3 週 1 コース 観察時間:フェスゴ投与後 30 分間 | |
| レジメン | (2 回目以降)フェスゴ療法 | | | 番号 | SBR-49 |
| 適 応 | HER2 陽性の乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| フェスゴ MA | 1 瓶/body | 第 1 日 | s.c | 3 週 1 コース 観察時間:フェスゴ投与後 15 分間 | |
| レジメン | (初回)フェスゴ+DOC 療法 | | | 番号 | SBR-50 |
| 適 応 | HER2 陽性の乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| フェスゴ IN | 1 瓶/body | 第 1 日 | s.c | 3 週 1 コース 観察時間:フェスゴ投与後 30 分間 | |
| ドセタキセル | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | (2 回目以降)フェスゴ+DOC 療法 | | | 番号 | SBR-51 |
| 適 応 | HER2 陽性の乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| フェスゴ MA | 1 瓶/body | 第 1 日 | s.c | 3 週 1 コース 観察時間:フェスゴ投与後 15 分間 | |
| ドセタキセル | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|-------|------|--|--------|
| レジメン | 乳がん PER+HER+ERI 療法 | | | 番号 | SBR-52 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パージェタ | 840mg/body(初回のみ) 420mg/body(2回目以降) | 第1日 | div | 3週1コース ERI減量時の投与量 | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | 1.4mg/m ² → 1.1mg/m ² → 0.7mg/m ² → 中止 | |
| エリブリン | 1.4mg/m ² | 第1,8日 | div | | |
| レジメン | 乳がん トロデルビ療法 | | | 番号 | SBR-53 |
| 適 応 | 乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トロデルビ | 10mg/kg | 第1,8日 | div | 3週1コース 前投薬開始時、アセトアミノ フェン 500mg 併用 | |
| レジメン | 食道がん DOC 療法 | | | 番号 | SES-01 |
| 適 応 | 転移・進行・再発食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 70mg/m ² | 第1日 | div | 3週1コース | |
| レジメン | 食道がん CDDP+5FU 療法 | | | 番号 | SES-02 |
| 適 応 | 転移・進行・再発食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第1日 | div | 4週1コース | |
| 5-FU | 800mg/m ² | 第1～5日 | div | | |
| レジメン | 食道がん CDDP+5FU 低用量療法 | | | 番号 | SES-03 |
| 適 応 | 転移・進行・再発食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 10mg/m ² | 第1日 | div | 4週1コース | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第1～5日 | div | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------|
| レジメン | 食道がん放射線併用 CDDP+5FU 低用量 (FP)療法 | | | 番号 | SES-08 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 5mg/body | 第1～5日 | div | 放射線照射中継続 | |
| 5-FU | 250mg/body | 第1～5日 | div | | |
| レジメン | 食道がん 5FU+CDDP+DOC 療法 | | | 番号 | SES-09 |
| 適 応 | 食道がん(切除不能・再発・転移) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 60mg/m ² | 第1日 | div(1時間) | 4週1コース | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第1日 | div(1時間) | | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第1～4日 | div (24時間持続) | | |
| レジメン | 食道がん 5FU+nedaplatin+DOC 療法 | | | 番号 | SES-10 |
| 適 応 | 食道がん(切除不能・再発・転移) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アクプラ | 60mg/m ² | 第1日 | div(1時間) | 4週1コース | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第1日 | div(1時間) | | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第1～4日 | div (24時間持続) | | |
| レジメン | 食道がん 放射線併用低用量DOC療法 | | | 番号 | SES-11 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 10mg/m ² | 第1,8,15 22,29,36日 | div | 6週1コース | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|---------|-----------|--------------------------|--------|
| レジメン | 食道がん FOLFOX 療法 | | | 番号 | SES-12 |
| 適 応 | 切除不能進行再発食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | 食道がん放射線併用 FOLFOX 療法 | | | 番号 | SES-13 |
| 適 応 | 切除不能進行再発食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 1600mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | 食道がん Nivo 療法 | | | 番号 | SES-14 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 240mg/body | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース | |
| レジメン | 食道がん Pembro+CDDP+5FU 療法 | | | 番号 | SES-15 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| 5-FU | 800mg/m ² | 第 1~5 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|----------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | 食道がん Nivo+5FU+CDDP 療法 | | | 番号 | SES-16 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 480mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| 5-FU | 800mg/m ² | 第 1～5 日 | div | | |
| レジメン | 食道がん Nivo+Ipi 療法 | | | 番号 | SES-17 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 360mg/body | 第 1,22 日 | div | 6 週 1 コース | |
| ヤーボイ | 1mg/kg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | 食道がん DAC-TAM 療法 | | | 番号 | SES-18 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ダカルバジン | 220mg/body | 第 1～3 日 | div | 4 週 1 コース | |
| ニドラン | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| シスプラチン | 25mg/m ² | 第 1～3 日 | div | | |
| タモキシフェン | 20 mg/日 | 第 1～28 日 | p.o. | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|------|--------------------------|---------|
| レジメン | 胃がん MTX+5FU 交代療法 | | | 番号 | ◎SST-01 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| メソトレキセート | 30~100mg/m ² | 第 1 日 | div | 1~2 週 1 コース | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| ロイコボリン | 10mg/m ² /回 | メソトレキセート投与 24 時間後より 6 時間ごとに計 6 回 | | | |
| レジメン | 胃がん CPT-11+CDDP 療法 | | | 番号 | SST-03 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 70mg/m ² | 第 1,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | 胃がん CPT-11 療法 | | | 番号 | SST-04 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | 胃がん weekly PTX 療法 | | | 番号 | ◎SST-05 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | 胃がん DOC 療法 | | | 番号 | SST-07 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|---------|
| レジメン | 胃がん S-1+CDDP 療法 | | | 番号 | SST-08 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80～120mg/日 | 第1～21日 | 40～60mg/回 1日2回 p.o | 5週1コース 第8,9日は充分量の補液を 要す | |
| シスプラチン | 60mg/m ² | 第8日 | div | | |
| レジメン | 胃がん S-1+CPT-11 療法 | | | 番号 | ◎SST-09 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80mg/m ² (分2) | 第1～21日 | p.o. | 5週1コース | |
| トポテシン | 80mg/m ² | 第1,15日 | div(2時間) | | |
| レジメン | 胃がん S-1+DOC 療法 | | | 番号 | SST-10 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80～120mg/日 | 第1～14日 | 40～60mg/回 1日2回 p.o | 3～4週1コース | |
| ドセタキセル | 40mg/m ² | 第1日 | div | | |
| レジメン | 胃がん HER+Cape+CDDP 療法 | | | 番号 | SST-12 |
| 適 応 | 治癒切除不能・進行再発胃がん (HER2 2+以上) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | 3週1コース 繰り返し | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第1日 | div | | |
| カペシタビン | 2000mg/m ² /分2 | 第1(夕)～ 15(朝)日 | p.o(14日間) | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 胃がん HER+S-1 療法 | | | 番号 | SST-13 |
| 適 応 | 切除不能・進行再発胃がん (HER2 2+ 以上) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80~120mg/日 | 第1~14日 | 40~60mg/回 1日2回 p.o | 3週1コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg (初回のみ) 6mg/kg (2回目以降) | 第1日 | div 初回90分 2回目以降 30分 | | |
| レジメン | 胃がん SOX (100) 療法 | | | 番号 | SST-14 |
| 適 応 | 切除不能 進行・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オキサリプラチン | 100mg/m ² | 第1日 | div 2時間 | 3週1コース | |
| S-1 | 80mg/m ² | 第1~14日 | p.o. | | |
| レジメン | 胃がん RAM+PTX 療法 | | | 番号 | SST-15 |
| 適 応 | 切除不能 進行・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| サイラムザ | 8mg/kg | 第1,15日 | div 初回60分 2回目以降30分 | 4週1コース | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第1,8,15日 | div 1時間 | | |
| レジメン | 胃がん RAM 単剤療法 | | | 番号 | SST-16 |
| 適 応 | 切除不能 進行・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| サイラムザ | 8mg/kg | 第1,15日 | div 初回60分 2回目以降30分 | 4週1コース | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|----------|----------------------------|-------------------------------|--------|
| レジメン | 胃がん CAPOX 療法 | | | 番号 | SST-17 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カペシタビン | 2000mg/m ² | 14日間 | p.o.(分2) | 3週1コース 術後補助化学療法の場合、 半年間 | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 第1日 | div 2時間 | | |
| レジメン | 胃がん Nivo 療法 (2週間ごと) | | | 番号 | SST-18 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 240mg/body | 第1日 | div | 2週1コース | |
| レジメン | 胃がん weekly nabPTX 療法 | | | 番号 | SST-19 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アブラキサン | 100mg/m ² | 第1,8,15日 | div | 4週1コース | |
| レジメン | 胃がん RAM+weekly nabPTX 療法 | | | 番号 | SST-20 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| サイラムザ | 8mg/kg | 第1,15日 | div 初回 60分 2回目以降 30分 | 4週1コース | |
| アブラキサン | 100mg/m ² | 第1,8,15日 | div | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|--------|----------------|---|--------|
| レジメン | 胃癌 CAPOX+HER 療法 | | | 番号 | SST-21 |
| 適応 | 胃癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | 3週1コース | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 第1日 | div | | |
| カペシタビン | 2000mg/m ² /分2 | 第1~14日 | p.o. (14日間) | | |
| レジメン | 胃癌 エンハーツ療法 | | | 番号 | SST-22 |
| 適応 | HER2 陽性 進行再発胃癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エンハーツ | 6.4mg/kg | 第1日 | div | 3週1コース 減量時の投与量 6.4mg/kg → 5.4mg/kg → 4.4mg/kg → 中止 | |
| レジメン | 胃癌 Nivo+SOX (100) 療法 | | | 番号 | SST-23 |
| 適応 | HER2 陰性治癒切除不能胃癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80mg~120mg/日 | 第1~14日 | p.o. | 3週1コース | |
| オブジーボ | 360mg/body | 第1日 | div | | |
| オキサリプラチン | 100mg/m ² | 第1日 | div | | |
| レジメン | 胃癌 Nivo+CAPOX 療法 | | | 番号 | SST-24 |
| 適応 | HER2 陰性治癒切除不能胃癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与薬剤名 | |
| カペシタビン | 2000mg/m ² | 第1~14日 | p.o. | 3週1コース | |
| オブジーボ | 360mg/body | 第1日 | div | | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 第1日 | div | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------------|----------|-----------|--------------------------|--------|
| レジメン | 胃がん Nivo+FOLFOX 療法 | | | 番号 | SST-25 |
| 適 応 | HER2 陰性治癒切除不能胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 240mg/body | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース | |
| アインボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | 胃がん Pembro+SOX (100) 療法 | | | 番号 | SST-26 |
| 適 応 | HER2 陰性治癒切除不能胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80mg~120mg/日 | 第 1~14 日 | p.o. | 3 週 1 コース | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | | |
| オキサリプラチン | 100mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | 胃がん Pembro+CAPOX 療法 | | | 番号 | SST-27 |
| 適 応 | HER2 陰性治癒切除不能胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与薬剤名 | |
| カペシタビン | 2000mg/m ² | 第 1~14 日 | p.o. | 3 週 1 コース | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|----------|---|--------|----------|--------------------------|--------|
| レジメン | 胃がん Zolbetuximab+SOX (100) 療法 | | | 番号 | SST-28 |
| 適 応 | CLDN18.2 陽性治癒切除不能胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80mg～120mg/日 | 第1～14日 | p.o. | 3週1コース | |
| ビロイ | 800 mg/m ² (初回のみ) 600 mg/m ² (2回目以降) | 第1日 | div | | |
| オキサリプラチン | 100mg/m ² | 第1日 | div | | |
| レジメン | 胃がん Zolbetuximab +CAPOX 療法 | | | 番号 | SST-29 |
| 適 応 | CLDN18.2 陽性治癒切除不能胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与薬剤名 | |
| カペシタビン | 2000mg/m ² | 第1～14日 | p.o. | 3週1コース | |
| ビロイ | 800 mg/m ² (初回のみ) 600 mg/m ² (2回目以降) | 第1日 | div | | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 第1日 | div | | |
| レジメン | 胃がん Zolbetuximab +FOLFOX 療法 | | | 番号 | SST-30 |
| 適 応 | CLDN18.2 陽性治癒切除不能胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ビロイ | 800 mg/m ² (初回のみ) 400 mg/m ² (2回目以降) | 第1日 | div | 2週1コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第1日 | div | | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第1日 | div | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第1日 | div | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第1日 | 46時間持続静注 | | |

| | | | | | |
|----------|--|--|----------------------------------|--|--------|
| レジメン | 大腸がん CPT-11 単剤療法 | | | 番号 | SCO-03 |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース | |
| レジメン | 大腸がん Cet 単剤療法 | | | 番号 | SCO-17 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 400mg/m ² (初回のみ) 250mg/m ² (2回目以降) | 第 1 日 | div (初回 120 分、 2回目以降 60 分) | 1 週毎繰り返し | |
| レジメン | 大腸がん Cet+Biweekly CPT-1 併用療法 | | | 番号 | SCO-18 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 400mg/m ² (初回のみ) 250mg/m ² (2回目以降) | 第 1,8,15,22,29, 36,43 日 | div (初回 120 分、2回 目以降 60 分) | 7週1コース アービタックス 1 週毎 繰り返し | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1,15,29 日 | div(90 分) | トポテシン2週ごと3回投与後、3 週休薬 | |
| レジメン | 大腸がん CAPOX 療法 | | | 番号 | SCO-21 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カペシタビン | *2000mg/m ² | 第 1～14 日 第 1 日目夕～第 15 日目 朝まで 14 日間 | p.o.(分 2) | 3 週 1 コース *体表面積 1.36 m ² 未満 1200mg/回 1.36 m ² 以上～1.66 m ² 未満 1500mg/回 1.66 m ² 以上～1.96 m ² 未満 1800mg/回 1.96 m ² 以上 2100mg/回 | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|-------------------------------------|---|--------|
| レジメン | 大腸がん CAPOX+Bev 療法 | | | 番号 | SCO-22 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カペシタビン | *2000mg/m ² | 第1～14日 第1日目夕～第15日目朝まで 14日間 | p.o.(分2) | 3週1コース *体表面積 1.36 m ² 未満 1200mg/回 1.36 m ² 以上～1.66 m ² 未満 1500mg/回 1.66 m ² 以上～1.96 m ² 未満 1800mg/回 1.96 m ² 以上 2100mg/回 | |
| ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 第1日 | div 初回90分、 2回目60分 3回目以降30分 | | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 第1日 | div 2時間 | | |
| レジメン | 大腸がん IRIS 療法 | | | 番号 | SCO-23 |
| 適 応 | 切除不能 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 125mg/m ² | 第1,15日 | div 2時間 | 4週1コース 繰り返し | |
| S-1 | 80～120mg/日 | 第1～14日 | p.o. | | |
| レジメン | 大腸がん Cet+FOLFIRI 療法 | | | 番号 | SCO-26 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 400mg/m ² (初回のみ) 250mg/m ² (2回目以降) | 第1,8日 | div (初回120分、2回目以降60分) | 2週1コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第1日 | div 2時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第1日 | div 2時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第1日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第1～3日 | div 46時間 前記5-FU投与後 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん Pani 単剤療法 | | | 番号 | SCO-28 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベクティ ビックス | 6mg/kg | 第 1 日 | div 60 分 | 2 週 1 コース | |
| レジメン | 大腸がん Pani+FOLFIRI 療法 | | | 番号 | SCO-31 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベクティ ビックス | 6mg/kg | 第 1 日 | div 60 分 | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1～3 日 | div 46 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がん Cet+mFOLFOX6 療法 | | | 番号 | SCO-33 |
| 適 応 | 切除不能・進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 400mg/m ² (初回のみ) | 第 1,8 日 | div (初回 120 分、 2回目以降 60 分) | 2 週 1 コース | |
| | 250mg/m ² (2回目以降) | | | | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 オキサリプラチンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1～3 日 | div 46 時間 | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん SOX (130) +Bev 療法 | | | 番号 | SCO-34 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80~120mg/日 | 第1~14日 | p.o. | 3週1コース * | |
| ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 第1日 | div 初回90分、 2回目60分 3回目以降30分 | | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 第1日 | div 2時間 | | |
| レジメン | 大腸がん Pani+IRIS 療法 | | | 番号 | SCO-36 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80~120mg/日 | 第1~14日 | p.o. | 4週1コース * | |
| ベクティ ビックス | 6mg/kg | 第1,15日 | div 60分 | | |
| トポテシン | 125mg/m ² | 第1,15日 | div 2時間 | | |
| レジメン | 大腸がん RAM+FOLFIRI 療法 | | | 番号 | SCO-37 |
| 適 応 | 切除不能 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| サイラムザ | 8mg/kg | 第1日 | div 初回60分 2回目以降30分 | 2週1コース | |
| トポテシン | 180mg/m ² | 第1日 | div 2時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第1日 | div 2時間 トポテシンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第1日 | div(全開) アイソボリン 投与後 | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第1~3日 | div 46時間 前記5-FU投与後 | | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん SIRB 療法 | | | 番号 | SCO-38 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80～120mg/日 | 第1～14日 | p.o. | 4週1コース * | |
| ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 第1日 | div 初回90分、 2回目60分 3回目以降30分 | | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第1日 | div 90分 | | |
| レジメン | 大腸がん FOLFOXIRI 療法 | | | 番号 | SCO-39 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 165mg/m ² | 第1日 | div(2時間) | 2週1コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第1日 | div(2時間) | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第1日 | div(2時間) オキサリプラチン と 同時投与 | | |
| 5-FU | 3200mg/m ² | 第1日 | 46時間持続静注 | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------------------|---|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん FOLFOXIRI+Bev 療法 | | | 番号 | SCO-40 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベバシズマブ | 5mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 165mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) オキサリプラチン と 同時投与 | | |
| 5-FU | 3200mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | 大腸がん TAS102+Bev 療法 | | | 番号 | SCO-41 |
| 適 応 | 切除不能進行再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ロンサーフ | 35mg/m ² /回 1 日 2 回 | 第 1～5 日 第 8～12 日 | p.o. | 4 週 1 コース | |
| ベバシズマブ | 5mg/kg | 第 1,15 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | | |
| レジメン | 大腸がん PER+HER 療法 | | | 番号 | SCO-42 |
| 適 応 | がん化学療法後に増悪した HER2 陽性の治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パージェタ | 840mg/body(初回のみ) 420mg/body(2 回目以降) | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ハーセプチン | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2 回目以降) | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|------------|-----------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん SOX (130) 療法 | | | 番号 | SCO-43 |
| 適 応 | 切除不能 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オキサリプラチン | 130mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | 3 週 1 コース | |
| S-1 | 80mg/m ² | 第 1~14 日 | p.o. | | |
| レジメン | 膵がん GEM 療法 | | | 番号 | SPA-01 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | FOLFIRINOX 療法 | | | 番号 | SPA-02 |
| 適 応 | 膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) トポテシンと 同時投与 | | |
| トポテシン | 180mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | 胆道がん GEM 療法 | | | 番号 | SBI-01 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |

《産婦人科》

| | | | | | |
|---------|--------------------------|-------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | PTX 単剤療法 | | | 番号 | GOV-01 |
| 適 応 | 進行卵巣がん、臨床的 NED 症例の維持化学療法 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 180mg/m ² | 第 1 日 | div | 3-4 週休薬 原則 12 コース | |
| レジメン | CBDCA + CPT-11 療法 | | | 番号 | GOV-02 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | 2 週休薬 | |
| トポテシン | 50mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | | |
| レジメン | TC 療法 | | | 番号 | GOV-03 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 第 1 日 | div | 3-4 週休薬 | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | DC 療法 | | | 番号 | GOV-04 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 70mg/m ² | 第 1 日 | div | 3-4 週休薬 | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | CPT-11 療法 | | | 番号 | GOV-05 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1,15,29 日 | div | 3 週休薬 | |

| | | | | | |
|---------|--|------------|-------------|---------------------------|--------|
| レジメン | CPT-11+nedaplatin 療法 | | | 番号 | GOV-06 |
| 適 応 | 卵巣がん、カルボプラチンにアレルギー反応を示す症例 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 50mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div(120 分) | 2 週休薬 2 コースで効果判定 | |
| アクプラ | 80mg/m ² | 第 1 日 | div(60 分以上) | | |
| レジメン | BEP 療法 | | | 番号 | GOV-08 |
| 適 応 | 卵巣胚細胞性腫瘍 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 20mg/m ² | 第 1-5 日 | div | 3~4 週 1 コース 最大 4 コースまで | |
| エトポシド | 100mg/m ² | 第 1-5 日 | div | | |
| ブレオ | 20 mg/m ² (Max30mg/body) | 第 2,9,16 日 | div | | |
| レジメン | ドキシル単剤療法 | | | 番号 | GOV-09 |
| 適 応 | 卵巣がん(再発・薬剤耐性) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドキシル | 40~50mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | パクリタキセル+ネダプラチン療法 | | | 番号 | GOV-10 |
| 適 応 | 卵巣がん、カルボプラチンにアレルギー反応を示す症例 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 180mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 週休薬 | |
| アクプラ | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | ドセタキセル単剤療法 | | | 番号 | GOV-11 |
| 適 応 | 卵巣がん維持化学療法 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 70mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 12 コース | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|------------|--|--------------------------|--------|
| レジメン | weekly パクリタキセル療法 | | | 番号 | GOV-12 |
| 適応 | 進行・再発卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 1週休薬 | |
| レジメン | ジェムシタビン(GEM)療法 | | | 番号 | GOV-13 |
| 適応 | 再発卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4週1コース | |
| レジメン | TC+Bev 療法 | | | 番号 | GOV-14 |
| 適応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 第 1 日 | div | 3週1コース | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | 6コース | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------|--|--|--------|
| レジメン | Bev 単剤療法 | | | 番号 | GOV-15 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース TC+Bev 療法 6 コース後 16 コース | |
| レジメン | ドセタキセル+Bev 療法 | | | 番号 | GOV-16 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 70mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |
| レジメン | ドキシル+Bev 療法 | | | 番号 | GOV-17 |
| 適 応 | 再発卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドキシル | 40mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |
| レジメン | TC 療法 | | | 番号 | GUT-02 |
| 適 応 | 子宮頸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース カルボプラチンの上限は 400mg/m ² | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------------|-------------|--|--------|
| レジメン | CPT11+nedaplatin 療法 | | | 番号 | GUT-03 |
| 適 応 | 進行・再発子宮頸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 50mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div(120 分) | 4 週 1 コース | |
| アクプラ | 80mg/m ² | 第 1 日 | div(60 分以上) | | |
| レジメン | シスプラチン療法 | | | 番号 | GUT-04 |
| 適 応 | 再発子宮頸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 50mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レジメン | DC 療法 | | | 番号 | GUT-06 |
| 適 応 | 子宮頸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3-4 週休薬 | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | weeklyCDDP+放射線療法 | | | 番号 | GUT-07 |
| 適 応 | 子宮頸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 40mg/m ² | 第 1 日 | div | 1 週 1 コース 放射線療法が終了するま で(4~5 コース) | |
| レジメン | TC 療法 | | | 番号 | GEN-01 |
| 適 応 | 子宮体がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------|------|---|--------|
| レジメン | DC 療法 | | | 番号 | GEN-02 |
| 適 応 | 子宮体がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | PTX 単剤療法 | | | 番号 | GEN-03 |
| 適 応 | 子宮体がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レジメン | AP 療法 | | | 番号 | GEN-04 |
| 適 応 | 子宮体がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アドリアシン | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース アドリアシン 生涯投与量 500mg/m ² まで | |
| シスプラチン | 50mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | アドリアシン単剤療法 | | | 番号 | GEN-05 |
| 適 応 | 子宮体がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アドリアシン | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース アドリアシン 生涯投与量 500mg/m ² まで | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------------|------|---|--------|
| レジメン | Pembro+レンバチニブ療法 | | | 番号 | GEN-06 |
| 適 応 | 子宮体がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レンビマ | 20mg/回 1 日 1 回 | 第 1 日～21 日 | p.o. | レンビマ減量方法 1 段階減量:14mg/日 2 段階減量:10mg/日 3 段階減量:8 又は 4mg/ 日 | |
| レジメン | 腹腔内化学療法 | | | 番号 | GOT-01 |
| 適 応 | | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(GFR+25)mg | 第 1 日 | 腹腔内 | 2 週休薬 | |

《泌尿器科》

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------|------|----------------------------------|--------|
| レジメン | M-VAC 療法 (CDDP) | | | 番号 | UBC-01 |
| 適 応 | 尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| メソトレキセート | 30mg/m ² | 第 1,15,22 日 | div | 4週1コース | |
| エクザール | 3mg/m ² | 第 2,15,22 日 | div | 2~4 コース | |
| アドリアシン | 30mg/m ² | 第 2 日 | div | アドリアシン | |
| シスプラチン | 70mg/m ² | 第 2 日 | div | 生涯投与量 500mg/m ² まで | |
| レジメン | M-VAC 療法 (CBDCA) | | | 番号 | UBC-02 |
| 適 応 | 尿路上皮がん (シスプラチン不適応症例) [保険適応なし] | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| メソトレキセート | 30mg/m ² | 第 1,15,22 日 | div | 4週1コース | |
| エクザール | 3mg/m ² | 第 2,15,22 日 | div | 2~4 コース | |
| アドリアシン | 30mg/m ² | 第 2 日 | div | アドリアシン | |
| カルボプラチン | AUC4.5 4.5×(GFR+25)mg | 第 2 日 | div | 生涯投与量 500mg/m ² まで | |
| レジメン | GC 療法 (4 週毎 CDDP) | | | 番号 | UBC-05 |
| 適 応 | 尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| シスプラチン | 70mg/m ² | 第 2 日 | div | 4~6 コース | |

| | | | | | |
|---------|------------------------------|-------------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | GC 療法(4 週毎 CBDCA) | | | 番号 | UBC-06 |
| 適 応 | 尿路上皮がん(シスプラチン不適応症例) [保険適応なし] | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 2 日 | div | 4~6 コース | |
| レジメン | 膀胱内注入療法 | | | 番号 | UBC-07 |
| 適 応 | 膀胱がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ピノルビン | 20mg | 1 週～ 1 ヶ月に 1 回 | 膀胱注 | 期間は不定 | |
| レジメン | 膀胱内注入療法 | | | 番号 | UBC-08 |
| 適 応 | 膀胱がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| マイトマイシン | 10~20mg | 1 週～ 1 ヶ月に 1 回 | 膀胱注 | 期間は不定 | |
| レジメン | GEM+PTX 療法(GP 療法) | | | 番号 | UBC-09 |
| 適 応 | 尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 200mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | | |
| レジメン | GEM 療法 | | | 番号 | UBC-10 |
| 適 応 | 尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------|------------|----------|---|--------|
| レジメン | Pembro 療法 (3 週間ごと) | | | 番号 | UBC-11 |
| 適 応 | 尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | Div 30 分 | 3 週 1 コース | |
| レジメン | Pembro 療法 (6 週間ごと) | | | 番号 | UBC-12 |
| 適 応 | 尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 400mg/body | 第 1 日 | Div 30 分 | 6 週 1 コース | |
| レジメン | バベンチオ維持療法 | | | 番号 | UBC-13 |
| 適 応 | 根治切除不能な尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| バベンチオ | 10mg/kg | 第 1 日 | Div 60 分 | 2 週 1 コース バベンチオ投与 30 分～60 分 前にアセトアミノフェン投与 | |
| レジメン | パドセブ療法 | | | 番号 | UBC-14 |
| 適 応 | がん化学療法後に増悪した根治切除不能な尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パドセブ | 1.25mg/kg | 第 1,8,15 日 | Div 30 分 | 4 週 1 コース | |
| レジメン | Nivo 療法 (2 週間ごと) | | | 番号 | UBC-15 |
| 適 応 | 膀胱全摘後 アジュバント | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 240mg/body | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース 膀胱全摘後 12 カ月投与 | |

| | | | | | |
|---------|------------------------------|------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | Nivo 療法 (4 週間ごと) | | | 番号 | UBC-16 |
| 適 応 | 膀胱全摘後 アジュバント | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 480mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース 膀胱全摘後 12 カ月 | |
| レジメン | GC 療法(3 週毎 CDDP) | | | 番号 | UBC-17 |
| 適 応 | 尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 3 週 1 コース | |
| シスプラチン | 70mg/m ² | 第 2 日 | div | | |
| レジメン | GC 療法(3 週毎 CBDCA) | | | 番号 | UBC-18 |
| 適 応 | 尿路上皮がん(シスプラチン不適応症例) [保険適応なし] | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 2 日 | div | | |
| レジメン | Pembro+パドセブ療法 | | | 番号 | UBC-19 |
| 適 応 | 尿路上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| パドセブ | 1.25mg/kg | 第 1,8 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | BEP 療法 | | | 番号 | UTC-01 |
| 適 応 | 精巣腫瘍 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 20mg/m ² | 第 1-5 日 | div | 2-3 コース 1st line | |
| エトポシド | 100mg/m ² | 第 1-5 日 | div | | |
| ブレオ | 30mg/body | 第 1,8,15 日 | div | | |
| レジメン | TIP 療法 | | | 番号 | UTC-02 |
| 適 応 | 精巣腫瘍 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 210mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| イホマイド | 1.5g/m ² | 第 2-5 日 | div | | |
| シスプラチン | 20mg/m ² | 第 2-5 日 | div | | |
| レジメン | IDP 療法 | | | 番号 | UTC-03 |
| 適 応 | 精巣腫瘍 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース 3~4 コース | |
| イホマイド | 1.5g/m ² | 第 1-3 日 | div | | |
| カルボプラチン | 300mg/m ² | 第1日 | div | | |
| レジメン | VeIP 療法 | | | 番号 | UTC-04 |
| 適 応 | 精巣腫瘍 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エクザール | 0.11mg/kg | 第 1,2 日 | div | 3 週 1 コース 3~4 コース | |
| イホマイド | 1.2g/m ² | 第 1 -5 日 | div | | |
| シスプラチン | 20mg/m ² | 第 1-5 日 | div | | |
| レジメン | VIP 療法 | | | 番号 | UTC-05 |

| | | | | |
|---------|----------------------|----------|------|---|
| 適 応 | 精巣腫瘍 | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| エトポシド | 75mg/m ² | 第 1-5 日 | div | 3 週 1 コース 3~4 コース |
| イホマイド | 1.2g/m ² | 第 1-5 日 | div | |
| シスプラチン | 20mg/m ² | 第 1-5 日 | div | |
| レジメン | CBDCA 単剤療法 | | | 番号 UTC-06 |
| 適 応 | 精巣腫瘍 | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| カルボプラチン | AUC7 7×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 2 コース |
| レジメン | DP 療法 | | | 番号 UPC-02 |
| 適 応 | ホルモン抵抗性前立腺がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| ドセタキセル | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 最低 4 コース以上 |
| レジメン | カバジタキセル療法 | | | 番号 UPC-05 |
| 適 応 | 去勢抵抗性前立腺がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| ジェブタナ | 25mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース |
| プレドニン | 10mg/日(分 2) | 第 1~21 日 | p.o. | |
| レジメン | ダロルタミド+DOC 療法 | | | 番号 UPC-06 |
| 適 応 | 遠隔転移を有する前立腺癌 | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| ドセタキセル | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース DOC は 6 サイクルまで ダロルタミド: 減量方法 600mg/日→中止 |
| ダロルタミド | 1200mg/日(分 2) | 第 1~21 日 | p.o. | |
| レジメン | Nivo 療法 (2 週間ごと) | | | 番号 UKC-03 |

| | | | | |
|--------|-------------------------|------------|------|--|
| 適 応 | 根治切除不能または転移性腎がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| オブジーボ | 240mg/body | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース |
| レジメン | Nivo+Ipi 療法 | | 番号 | UKC-04 |
| 適 応 | 化学療法未治療の根治切除不能または転移性腎がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| オブジーボ | 240mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース |
| ヤーボイ | 1mg/kg | 第 1 日 | div | 4 コース |
| レジメン | Pembro+Axi 療法 (3 週間ごと) | | 番号 | UKC-05 |
| 適 応 | 治療歴のない根治切除不能または転移性腎がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース |
| アキシチニブ | 5mg/回 1 日 2 回 | 第 1 日～21 日 | p.o. | アキシチニブ: 忍容性が認められる場合、1 回 7mg→10mg に増量できる。 副作用が見られた場合は減量、休薬又は中止。減量して投与を継続する場合は、副作用の症状、重症度等に応じて 1 回 3mg→1 回 2mg に減量する。 |
| レジメン | Nivo 療法 (4 週間ごと) | | 番号 | UKC-06 |
| 適 応 | 根治切除不能または転移性腎がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| オブジーボ | 480mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|------------|------|--|--------|
| レジメン | Nivo+Cabo 療法 (2 週間ごと) | | | 番号 | UKC-07 |
| 適 応 | 根治切除不能または転移性腎がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 240mg/body | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース | |
| カボメティクス | 40mg/日 | 第 1 日～14 日 | p.o. | カボメティクス減量方法 1 段階減量:20mg/日 2 段階減量:20mg/日を隔日投与 20mg/日の隔日投与で忍容不能な場合、投与中止 | |
| レジメン | Pembro+レンバチニブ療法 | | | 番号 | UKC-08 |
| 適 応 | 根治切除不能または転移性腎がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レンビマ | 20mg/回 1 日 1 回 | 第 1 日～21 日 | p.o. | レンビマ減量方法 1 段階減量:14mg/日 2 段階減量:10mg/日 3 段階減量:8 又は 4mg/日 | |
| レジメン | Pembro 療法 (3 週間ごと) | | | 番号 | UKC-09 |
| 適 応 | 腎がん術後 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | Div | 3 週 1 コース | |
| レジメン | Pembro 療法 (6 週間ごと) | | | 番号 | UKC-10 |
| 適 応 | 腎がん術後 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 400mg/body | 第 1 日 | Div | 6 週 1 コース | |

| | | | | | |
|---------|------------------------|------------|------|--|--------|
| レジメン | Pembro+Axi 療法 (6 週間ごと) | | | 番号 | UKC-11 |
| 適 応 | 治療歴のない根治切除不能または転移性腎がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 400mg/body | 第 1 日 | div | 6 週 1 コース | |
| アキシチニブ | 5mg/回 1 日 2 回 | 第 1 日～42 日 | p.o. | アキシチニブ: 忍容性が認められる場合、1 回 7mg→10mg に増量できる。 副作用が見られた場合は減量、休薬又は中止。減量して投与を継続する場合は、副作用の症状、重症度等に応じて 1 回 3mg→1 回 2mg に減量する。 | |
| レジメン | Nivo+Cabo 療法 (4 週間ごと) | | | 番号 | UKC-12 |
| 適 応 | 根治切除不能または転移性腎がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 480mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| カボメティクス | 40mg/日 | 第 1 日～28 日 | p.o. | カボメティクス減量方法 1 段階減量: 20mg/日 2 段階減量: 20mg/日を隔日投与 20mg/日の隔日投与で忍容不能な場合、投与中止 | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------------|------|--|--------|
| レジメン | バベンチオ+Axi 療法 | | | 番号 | UKC-13 |
| 適 応 | 腎がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| バベンチオ | 10mg/kg | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース | |
| アキシチニブ | 5mg/回 1 日 2 回 | 第 1 日～14 日 | p.o. | バベンチオ投与 30 分～60 分前にアセトアミノフェン投与 アキシチニブ: 忍容性が認められる場合、1 回 7mg→10mg に増量できる。 副作用が見られた場合は減量、休薬又は中止。減量して投与を継続する場合は、副作用の症状、重症度等に応じて 1 回 3mg→1 回 2mg に減量する。 | |
| レジメン | TIP 療法 | | | 番号 | UPE-02 |
| 適 応 | 陰茎がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 第 1 日 | div | 3～4 週 1 コース | |
| イホマイド | 1.2g/m ² | 第 2-4 日 | div | | |
| シスプラチン | 25mg/m ² | 第 2-4 日 | div | | |

《呼吸器内科》

| | | | | | |
|---------|--------------------------|------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | CPT-11 単剤療法 | | | 番号 | RLC-02 |
| 適 応 | 小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 100mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | DOC 単剤療法 | | | 番号 | RLC-03 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レジメン | VNR 単剤療法 | | | 番号 | RLC-05 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ロゼウス | 20~25mg/m ² | 第 1,8 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レジメン | CBDCA+ PTX weekly 療法 | | | 番号 | RLC-06 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC4~6 4~6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| パクリタキセル | 70mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | | |
| レジメン | CBDCA+PTX 療法 | | | 番号 | RLC-07 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5~6 5~6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3~4 週 1 コース | |
| パクリタキセル | 200mg/m ² | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | CDDP+VP-16 (PVP)療法 | | | 番号 | RLC-08 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | 3~4 週 1 コース | |
| エトポシド | 100mg/m ² | 第 1-3 日 | div | | |
| レジメン | CBDCA+VP-16 療法 | | | 番号 | RLC-10 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3~4 週 1 コース | |
| エトポシド | 80mg/m ² | 第 1-3 日 | div | | |
| レジメン | CDDP+VNR 療法 | | | 番号 | RLC-11 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ロゼウス | 25mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| レジメン | CDDP+CPT-11 療法 | | | 番号 | RLC-15 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| トポテシン | 60mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------|------------------------|--|--|--------|
| レジメン | CBDCA+CPT-11 療法 | | | 番号 | RLC-16 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| トポテシン | 60mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |
| レジメン | Bev 単剤療法 | | | 番号 | RLC-24 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | 3 週 1 コース 腫瘍の増悪が 見られるまで | |
| レジメン | weekly CBDCA+PTX と同時胸部放射線療法 | | | 番号 | RLC-25 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC2 2×(Ccr+25)mg | 第 1,8,15 22,29,36 日 | div | 6 週 1 コース 放射線治療: | |
| パクリタキセル | 40mg/m ² | 第 1,8,15 22,29,36 日 | div | 1回 2 Gy 週 5 日 計 60 Gy 放射線治療終了後 3 週間休薬 | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------|------|--|--------|
| レジメン | PEM 単剤療法 | | | 番号 | RLC-27 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 葉酸:初回投与 7 日以上前から 0.5mg/ 日内服開始 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| レジメン | CBDCA+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-28 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース <ペムトレキセド> 葉酸:初回投与 7 日以上前から 0.5mg/ 日内服開始 | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| レジメン | CDDP+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-29 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 75 mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース <ペムトレキセド> 葉酸:初回投与 7 日以上前から 0.5mg/ 日内服開始 | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて)前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------|---------|--|---|--------|
| レジメン | AMR 単剤療法 | | | 番号 | RLC-30 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルセド | 40mg/m ² | 第 1～3 日 | div | 3～4 週 1 コース | |
| レジメン | Nogitecan 療法 | | | 番号 | RLC-31 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ハイカムチン | 1.0mg/m ² | 第 1～5 日 | div | 3～4 週 1 コース PD になるまで繰り返す (間質性肺炎既往患者の 2 次治療) | |
| レジメン | CDDP+PEM+Bev 療法 | | | 番号 | RLC-33 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ペメトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | <ペメトレキセド> 葉酸: 初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日内服開始 | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | VB12: 初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎 に筋注 デカドロン:(必要に応じて)前 日、翌日に 8 mg 分 2 内服 | |

| | | | | | |
|---------|----------------------------|-----|--------------------------------------|--|--------|
| レジメン | CBDCA+PEM+Bev 療法 | | | 番号 | RLC-34 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第1日 | div | 3週1コース <ペムレキセド> | |
| ペムレキセド | 500mg/m ² | 第1日 | div | 葉酸:初回投与7日以上前から0.5mg/日 p.o.開始 | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第1日 | div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分 | VB12:初回投与の少なくとも7日前に1mg/回、以後9週毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて)前日、翌日に8mg分2内服 | |
| レジメン | PEM+Bev 維持療法 | | | 番号 | RLC-35 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ペムレキセド | 500mg/m ² | 第1日 | div | 3週1コース | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第1日 | div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分 | CDDP (CBDCA) +PEM+Bev 療法4~6コース施行後のメン テナンスとして施行 <ペムレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 VB12: 9週毎に1mg/回筋注 デカドロン:(必要に応じて)前 日、翌日に8mg分2内服 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------|--------------------------------------|--|--------|
| レジメン | CBDCA+weeklyPTX+Bev 療法 | | | 番号 | RLC-36 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第1日 | div | 4週1コース | |
| パクリタキセル | 70mg/m ² | 第1,8,15日 | div | | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第1日 | div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分 | | |
| レジメン | CBDCA+S-1 療法 | | | 番号 | RLC-37 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(Ccr+25)mg | 第1日 | div | 3週1コース *体表面積 1.25 m ² 未満 80mg分2 1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満 100mg分2 1.5 m ² 以上 120mg分2 | |
| S-1 | *右記 | 第1～14日 | p.o. | | |
| レジメン | CBDCA+nabPTX 療法 | | | 番号 | RLC-39 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第1日 | div | 3週1コース | |
| アブラキサン | 100mg/m ² | 第1,8,15日 | div | | |
| レジメン | Nivo 療法 (2週間ごと) | | 番号 | RLC-40 | |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 240mg/body | 第1日 | div | 2週1コース | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------|------------------------|---|--------|
| レジメン | DOC+RAM 療法 | | | 番号 | RLC-41 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| サイラムザ | 10mg/kg | 第 1 日 | 初回 60 分 2 回目以降 30 分 | 3 週 1 コース | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第 1 日 | 60 分 | | |
| レジメン | Pembro 療法 (3 週間ごと) | | | 番号 | RLC-42 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | 30 分 | 3 週 1 コース | |
| レジメン | 低用量 CBDCA と同時胸部放射線療法 | | | 番号 | RLC-43 |
| 適 応 | 高齢者局所限局型非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | 30mg/m ² | 第 1 日 | div | 平日のみ合計 20 回 放射線治療:30 回 週 5 日 計 60 Gy | |
| レジメン | Atezo 療法 | | | 番号 | RLC-44 |
| 適 応 | 小細胞肺癌/非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 1200mg/body | 第 1 日 | 初回 60 分 2 回目以降 30 分 | 3 週 1 コース | |
| レジメン | イミフィンジ療法 (化学放射線療法後) | | | 番号 | RLC-45 |
| 適 応 | 切除不能Ⅲ期非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 第 1 日 | 60 分 | 4 週 1 コース 投与期間 12 カ月 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg | |

| | | | | | |
|---------|------------------------|------------|------|--|--------|
| レジメン | Pembro+CBDCA+PTX 療法 | | | 番号 | RLC-46 |
| 適 応 | 扁平上皮肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 4 コースまで | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| パクリタキセル | 200mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | Pembro+CBDCA+nabPTX 療法 | | | 番号 | RLC-47 |
| 適 応 | 扁平上皮肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 4 コースまで | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| アブラキサン | 100mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | | |
| レジメン | Pembro+CBDCA+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-48 |
| 適 応 | 非扁平上皮肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 4 コースまで <ペムトレキセド> 葉酸:初回投与 7 日以上前 から 0.5mg/日 内服開始 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週 毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg 分 2 内服 | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------|------|--|--------|
| レジメン | Pembro+CDDP+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-49 |
| 適 応 | 非扁平上皮肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 4 コースまで <ペムトレキセド> | |
| シスプラチン | 75 mg/m ² | 第 1 日 | div | 葉酸:初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日内服開始 VB12:初回投与の少なくとも 7 日 前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | デカドロン:(必要に応じて)前日、 翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| レジメン | Pembro+PEM 維持療法 | | | 番号 | RLC-50 |
| 適 応 | 非扁平上皮肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース <ペムトレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | VB12:9 週毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて)前日、 翌日に 8 mg分 2 内服 | |

| | | | | | |
|---------|------------------------|---------|--|--------------------------|--------|
| レジメン | Atezo+CBDCA+PTX+Bev 療法 | | | 番号 | RLC-51 |
| 適 応 | 非扁平上皮肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 1200mg/body | 第 1 日 | 初回 60 分、 2 回目以降 30 分 | 3 週 1 コース 4 コースまで | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| パクリタキセル | 200mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |
| レジメン | Atezo+Bev 維持療法 | | | 番号 | RLC-52 |
| 適 応 | 非扁平上皮肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 1200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | CDDP+VNR と同時胸部放射線療法 | | | 番号 | RLC-53 |
| 適 応 | 切除不能局所限局型非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| ロゼウス | 20mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------------------------|--|--------|
| レジメン | Atezo+CBDCA+VP-16 療法 | | | 番号 | RLC-54 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 1200mg/body | 第 1 日 | 初回 60 分、 2 回目以降 30 分 | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC6 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| エトポシド | 100mg/m ² | 第 1~3 日 | div | | |
| レジメン | Atezo+CBDCA+nabPTX 療法 | | | 番号 | RLC-55 |
| 適 応 | 化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 1200mg/body | 第 1 日 | 初回 60 分、 2 回目以降 30 分 | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| アブラキサン | 100mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | | |
| レジメン | Atezo+CBDCA+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-56 |
| 適 応 | 化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 1200mg/body | 第 1 日 | 初回 60 分、 2 回目以降 30 分 | 3 週 1 コース ＜ペムトレキセド＞ 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-------|-------------------------|---|--------|
| レジメン | Atezo+CDDP+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-57 |
| 適 応 | 化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 1200mg/body | 第 1 日 | 初回 60 分、 2 回目以降 30 分 | 3 週 1 コース <ペムトレキセド> | |
| シスプラチン | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| レジメン | Atezo+PEM 維持療法 | | | 番号 | RLC-58 |
| 適 応 | 化学療法未治療の扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 1200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース <ペムトレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:9 週毎に筋注 | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| レジメン | Pembro 療法 (6 週間ごと) | | | 番号 | RLC-59 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 400mg/body | 第 1 日 | Div 30 分 | 6 週 1 コース | |
| レジメン | Nivo 療法 (4 週間ごと) | | | 番号 | RLC-60 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 480mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|------------------------|--|--------|
| レジメン | RAM+EGFR-TKI 療法 | | | 番号 | RLC-61 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| サイラムザ | 10mg/kg | 第 1,15 日 | 初回 60 分 2 回目以降 30 分 | 4 週 1 コース | |
| EGFR-TKI | 添付文書に従う | 第 1~28 日 | p.o. | | |
| レジメン | Nivo+Ipi+CBDCA+PTX 療法 | | | 番号 | RLC-62 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 360mg/body | 第 1,22 日 | div | 6 週 1 コース | |
| ヤーボイ | 1mg/kg | 第 1 日 | div | | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1,22 日 | div | | |
| パクリタキセル | 200mg/m ² | 第 1,22 日 | div | | |
| レジメン | Nivo+Ipi+CBDCA+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-63 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 360mg/body | 第 1,22 日 | div | 6 週 1 コース ＜ペムトレキセド＞ 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| ヤーボイ | 1mg/kg | 第 1 日 | div | | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1,22 日 | div | | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1,22 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|------------|------|--|--------|
| レジメン | Nivo+Ipi+CDDP+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-64 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 360mg/body | 第 1,22 日 | div | 6 週 1 コース <ペムトレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| ヤーボイ | 1mg/kg | 第 1 日 | div | | |
| シスプラチン | 75mg/m ² | 第 1,22 日 | div | | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1,22 日 | div | | |
| レジメン | Nivo+Ipi 療法 | | | 番号 | RLC-65 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 360mg/body | 第 1,22 日 | div | 6 週 1 コース | |
| ヤーボイ | 1mg/kg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | weeklynabPTX 療法 | | | 番号 | RLC-66 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アブラキサン | 100mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レジメン | イミフィンジ+CDDP+VP-16 療法 | | | 番号 | RLC-67 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| エトポシド | 100mg/m ² | 第 1~3 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------|---------|------|--|--------|
| レジメン | イミフィンジ+CBDCA+VP-16 療法 | | | 番号 | RLC-68 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg | |
| エトポシド | 100mg/m ² | 第 1～3 日 | div | | |
| レジメン | イミフィンジ維持療法 | | | 番号 | RLC-69 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg | |
| レジメン | イミフィンジ+イジユド+CBDCA+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-70 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イジユド | 75mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| イミフィンジ | 1500 mg/body | 第 1 日 | div | 4 コースまで 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg | |
| カルボプラチン | AUC 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 20mg/kg <ペメトレキセド> | |
| ペメトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |

| | | | | | |
|---------|---|----------|------|---|--------|
| レジメン | イミフィンジ [®] +イジユド [®] +CDDP+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-71 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イジユド | 75mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| イミフィンジ | 1500 mg/body | 第 1 日 | div | 4 コースまで | |
| シスプラチン | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | 体重 30kg 以下はイミフィンジ | |
| ペメトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | 20mg/kg <ペメトレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| レジメン | イミフィンジ [®] +イジユド [®] +PEM 療法 | | | 番号 | RLC-72 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イジユド | 75mg/body | 第 29 日 | div | 8 週 1 コース(RLC-70,71 の 5,6 コース目に該当) | |
| イミフィンジ | 1500 mg/body | 第 1,29 日 | div | 1 コースまで | |
| ペメトレキセド | 500mg/m ² | 第 1,29 日 | div | 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg <ペメトレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------|------|--|--------|
| レジメン | イミフィンジ+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-73 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500 mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース(RLC-70,71 の 7 コース目以降に該当) 体重 30kg 以下はイミフィンジ | |
| ペメトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | 20mg/kg <ペメトレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| レジメン | イミフィンジ+イジユド+CBDCA+nabPTX 療法 | | | 番号 | RLC-74 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イジユド | 75mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| イミフィンジ | 1500 mg/body | 第 1 日 | div | 4 コースまで | |
| カルボプラチン | AUC 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 体重 30kg 以下はイミフィンジ | |
| アブラキサン | 100mg/m ² | 第 1 日 | div | 20mg/kg | |
| レジメン | イミフィンジ+イジユド療法 | | | 番号 | RLC-75 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イジユド | 75mg/body | 第 1,29 日 | div | 8 週 1 コース(RLC-74 の 5,6 コース目に該当) | |
| イミフィンジ | 1500 mg/body | 第 1,29 日 | div | 1 コースまで 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------|----------|------|---|--------|
| レジメン | イミフィンジ療法 | | | 番号 | RLC-76 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500 mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース(RLC-74 の 7 コース目以降に該当) 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg | |
| レジメン | エンハーツ療法 | | | 番号 | RLC-77 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エンハーツ | 5.4mg/ kg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 減量時の投与量 5.4mg/ kg → 4.4mg/ kg → 3.2mg/ kg → 中止 | |
| レジメン | Osimertinib+CDDP+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-78 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| タグリッソ | 80mg/日 | 第 1～21 日 | p.o. | 3 週 1 コース ＜ペムトレキセド＞ | |
| シスプラチン | 75 mg/m ² | 第 1 日 | div | 葉酸:初回投与 7 日以上前から 0.5mg/日 内服開始 | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | VB12: 初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg 分 2 内服 | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------|--------|------|--|--------|
| レジメン | Osimertinib+CBDCA+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-79 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| タグリッソ | 80mg/日 | 第1～21日 | p.o. | 3週1コース <ペムトレキセド> 葉酸:初回投与7日以上前から0.5mg/日内服開始 VB12:初回投与の少なくとも7日前に1mg/回、以後9週毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて)前日、翌日に8mg分2内服 | |
| カルボプラチン | AUC 5×(Ccr+25)mg | 第1日 | div | | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第1日 | div | | |
| レジメン | Osimertinib+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-80 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| タグリッソ | 80mg/日 | 第1～21日 | p.o. | 3週1コース <ペムトレキセド> 葉酸:初回投与7日以上前から0.5mg/日内服開始 VB12:初回投与の少なくとも7日前に1mg/回、以後9週毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて)前日、翌日に8mg分2内服 | |
| ペムトレキセド | 500mg/m ² | 第1日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------|-------|------|--|--------|
| レジメン | Nivo+CDDP+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-81 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 360mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| シスプラチン | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 コースまで <ペムレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 | |
| ペムレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |
| レジメン | Nivo+CBDCA+PEM 療法 | | | 番号 | RLC-82 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 360mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3 コースまで <ペムレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 | |
| ペムレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------|------------|------|--|-----------|
| レジメン | Nivo+CBDCA+PTX 療法 | | | 番号 | RLC-83 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 360mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3 コースまで | |
| パクリタキセル | 200mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | ライブリバント+CBDCA+PEM 療法 1 コース目 | | | 番号 | RLC-84,88 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ペトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース <ペトレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 VB12: 初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 | |
| カルボプラチン | AUC 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 <ライブリバント> RLC-84:80kg 未満 RLC-88:80kg 以上 前投薬としてアセトアミノフェ ン 800mg 内服 | |
| ライブリバント | 右記参照 | 第1,2,8,15日 | div | ライブリバント投与量 day1:350mg day2:1050mg (80kg 以上 1400mg) day8,15:1400mg (80kg 以上 1750mg) | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|-------|------|--|------------------------|
| レジメン | ライブリバンド+CBDCA+PEM 療法 2-4 コース目 | | | 番号 | RLC-85,86 RLC-89,90 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ペトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース <ペトレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 | |
| カルボプラチン | AUC 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 <ライブリバンド> RLC-85,86:80kg 未満 RLC-89,90:80kg 以上 前投薬としてアセトアミノフェ ン 800mg 内服 | |
| ライブリバンド | 右記参照 | 第 1 日 | div | ライブリバンド投与量 2 コース目:1400mg (80kg 以上 1750mg) 3,4 コース目:1750mg (80kg 以上 2100mg) | |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------|-------|------|--|-----------|
| レジメン | ライブリバント+CBDCA+PEM 療法 5 コース目以降 | | | 番号 | RLC-87,91 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ペメトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース <ペメトレキセド> 葉酸:0.5mg/日内服 VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、9 週毎に 筋注 デカドロン:(必要に応じて) | |
| ライブリバンド | 右記参照 | 第 1 日 | div | 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 <ライブリバンド> RLC-87:80kg 未満 RLC-91:80kg 以上 前投薬としてアセトアミノフェ ン 800mg 内服 ライブリバンド投与量 80kg 未満:1750mg 80kg 以上:2100mg | |
| レジメン | CDDP+PEM 療法 | | | 番号 | RMM-01 |
| 適 応 | 悪性胸膜中皮腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 75 mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース <ペメトレキセド> 葉酸:初回投与 7 日以上前 から 0.5mg/日内服開始 | |
| ペメトレキセド | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | VB12:初回投与の少なくとも 7 日前に 1 mg/回、以後 9 週 毎に筋注 デカドロン:(必要に応じて) 前日、翌日に 8 mg分 2 内服 | |

| | | | | | |
|--------|----------------------|----------|------|---|--------|
| レジメン | Nivo 療法 (2 週間ごと) | | | 番号 | RMM-02 |
| 適 応 | 悪性中皮腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 240mg/body | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース | |
| レジメン | Nivo 療法 (4 週間ごと) | | | 番号 | RMM-03 |
| 適 応 | 悪性中皮腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 480mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | Nivo+Ipi 療法 | | | 番号 | RMM-04 |
| 適 応 | 悪性胸膜中皮腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 360mg/body | 第 1,22 日 | div | 6 週 1 コース | |
| ヤーボイ | 1mg/kg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | ADOC 療法 | | | 番号 | RTH-01 |
| 適 応 | 胸腺腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アドリアシン | 40mg/m ² | 第 1 日 | div | 3-4 週 1 コース オンコビン 1 日 2mg まで アドリアシン 生涯投与量 500mg/m ² まで | |
| シスプラチン | 50mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| オンコビン | 0.6mg/m ² | 第 3 日 | div | | |
| エンドキサン | 700mg/m ² | 第 4 日 | div | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------|-------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | PAC 療法 | | | 番号 | RTH-02 |
| 適 応 | 胸腺腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アドリアシン | 50mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| シスプラチン | 50mg/m ² | 第 1 日 | div | アドリアシン 生涯投与量 | |
| エンドキサン | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | 500mg/m ² まで | |

《消化器内科》

| | | | | | |
|---------|---------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------|---------|
| レジメン | MTX+5FU 交代療法 | | | 番号 | ◎DST-01 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| メトレキセート | 30~100mg/m ² | 第 1 日 | div(15 分) | 7~14 日 1 コース | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| ロイコボリン | 10mg/m ² /回 | メトレキセート投与 24 時間後より 6 時間ごとに計 6 回 | | | |
| レジメン | weekly PTX 療法 | | | 番号 | ◎DST-02 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div(1 時間) | 4 週 1 コース | |
| レジメン | S-1+CPT-11 療法 | | | 番号 | ◎DST-03 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80mg/m ² (分 2) | 第 1~21 日 | p.o. | 5 週 1 コース | |
| トポテシン | 80mg/m ² | 第 1,15 日 | div(2 時間) | | |
| レジメン | S-1+CDDP 療法 | | | 番号 | DST-04 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80mg/m ² (分 2) | 第 1~21 日 | p.o. | 5 週 1 コース | |
| シスプラチン | 60mg/m ² | 第 8 日 | div(2 時間) | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------|----------|------------|--------------------------|--------|
| レジメン | CPT-11+CDDP 療法 | | | 番号 | DST-05 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 70mg/m ² | 第 1,15 日 | div(2 時間) | 4 週 1 コース | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| レジメン | 5-FU 療法 | | | 番号 | DST-06 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| 5-FU | 800mg/m ² | 第 1～5 日 | div(24 時間) | 4 週 1 コース | |
| レジメン | CPT-11+CDDP Biweekly 療法 | | | 番号 | DST-07 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 60mg/m ² | 第 1,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| シスプラチン | 30mg/m ² | 第 1,15 日 | div | | |
| レジメン | nabPTX 療法 | | | 番号 | DST-08 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アブラキサン | 260mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レジメン | 5-FU+CDDP 療法 | | | 番号 | DST-09 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 4 週 1 コース | |
| 5-FU | 800mg/m ² | 第 1～5 日 | div(24 時間) | | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------|
| レジメン | 1-LV+5FU(RPMI)療法 | | | 番号 | DST-10 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アイソボリン | 250mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div (2 時間) | 8 週 1 コース | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div(全開) | | |
| レジメン | mFOLFOX6 療法 | | | 番号 | DST-11 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | 1-LV+5FU(RPMI)療法 | | | 番号 | ◎DCO-01 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アイソボリン | 250mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div(2 時間) | 8 週 1 コース | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div(全開) | | |
| レジメン | mFOLFOX6 療法 | | | 番号 | DCO-02 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |

| | | | | | |
|--------|---------------------------|---------|-----------|------------------------------|---------|
| レジメン | FOLFIRI 療法 | | | 番号 | DCO-03 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 180mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | CPT-11+5-FU+I-LV (IFL) 療法 | | | 番号 | ◎DCO-04 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 100mg/m ² | 第 1,8 日 | div(2 時間) | 3 週 1 コース | |
| アイソボリン | 10mg/m ² | 第 1,8 日 | div(15 分) | | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1,8 日 | div(全開) | | |
| レジメン | CPT-11 療法 | | | 番号 | DCO-05 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 2 週サイクルで 2~3 回投与、その後 2~3 週休薬 | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|-------|--|--------------------------|--------|
| レジメン | mFOLFOX6 + Bev 療法 | | | 番号 | DCO-06 |
| 適 応 | 切除不能・転移性進行大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベバシズマブ | 5mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | FOLFIRI + Bev 療法 | | | 番号 | DCO-08 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベバシズマブ | 5mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | Pani + CPT-11 療法 | | | 番号 | DCO-10 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div | 14 週 1 コース | |
| ベクティビックス | 6mg/kg | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|------------|--------------------------|--------|
| レジメン | Pani + mFOLFOX6 療法 | | | 番号 | DCO-11 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベクティビックス | 6mg/Kg | 第 1 日 | div(60 分) | 2 週 1 コース | |
| アインボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | 5-FU 動注療法 | | | 番号 | DCO-12 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| 5-FU | 1000mg/m ² | 第 1 日 | 動注 | 毎週繰り返し | |
| レジメン | DOC 療法 | | | 番号 | DES-01 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 70mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 3 週 1 コース | |
| レジメン | 5-FU+Nedaplatin 療法 | | | 番号 | DES-02 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アクプラ | 90mg/m ² | 第 1 日 | div(90 分) | 4 週 1 コース | |
| 5-FU | 800mg/m ² | 第 1~5 日 | div(24 時間) | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|-------------------------|------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 5-FU+Nedaplatin+RT 療法 | | | 番号 | DES-03 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アクプラ | 90mg/m ² | 第 1,36 日 | div(90 分) | 9 週 1 コース | |
| 5-FU | 800mg/m ² | 第 1～5 日 第 36～40 日 | div(24 時間) | | |
| RT | 2Gy/日 | 5 日/週、6 週間 | | | |
| レジメン | 5-FU+CDDP 療法 | | | 番号 | DES-04 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 4 週 1 コース | |
| 5-FU | 800mg/m ² | 第 1～5 日 | div(24 時間) | | |
| レジメン | 5-FU+CDDP+RT 療法 | | | 番号 | DES-05 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 70mg/m ² | 第 1,29 日 | div(2 時間) | 8 週 1 コース | |
| 5-FU | 700mg/m ² | 第 1～4 日 第 29～32 日 | div(24 時間) | | |
| RT | 2Gy/日 | 5 日/週、6 週間 | | | |
| レジメン | weekly PTX 療法 | | | 番号 | DES-06 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 100mg/m ² | 第 1,8,15, 22,29,36 日 | div(1 時間) | 8 週 1 コース | |

| | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|----------------------------|--|--------|
| レジメン | GEM療法 | | | 番号 | DPA-01 |
| 適応 | 膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第1,8,15日 | div(30分) | 4週1コース | |
| レジメン | GEM+S-1療法(GS療法) | | | 番号 | DPA-02 |
| 適応 | 進行膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第1,8日 | div | 3週1コース *体表面積 | |
| S-1 | *右記 | 第1~14日 | p.o. | 1.25 m ² 未満 60mg/日 1.25 m ² 以上~1.5 m ² 未満 80mg/日 1.5 m ² 以上 100mg/日 | |
| レジメン | FOLFIRINOX療法 | | | 番号 | DPA-04 |
| 適応 | 膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第1日 | div(2時間) | 2週1コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第1日 | div(2時間) トポテシンと同 時投与 | | |
| トポテシン | 180mg/m ² | 第1日 | div(2時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第1日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第1日 | 46時間持続静注 | | |
| レジメン | GEM+エルロチニブ療法 | | | 番号 | DPA-05 |
| 適応 | 膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第1,8,15日 | div | 4週1コース | |
| タルセバ | 100mg/日 | 第1~28日 | p.o. | | |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------|
| レジメン | nabPTX+GEM 療法 | | | 番号 | DPA-06 |
| 適 応 | 膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アブラキサン | 125mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div(30 分) | 4 週 1 コース | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div(30 分) | | |
| レジメン | オニバイド+5-FU/LV 療法 | | | 番号 | DPA-07 |
| 適 応 | 膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オニバイド | 70mg/m ² | 第 1 日 | div(90 分) | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | ModifiedFOLFIRINOX 療法 | | | 番号 | DPA-08 |
| 適 応 | 膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) トポテシンと同 時投与 | | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | GEM+放射線療法 | | | 番号 | DPA-09 |
| 適 応 | 膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 250~600mg/m ² | 第 1 日 | div(30 分) | 1 週 1 コース 放射線治療中毎週投与 RT 50~54Gy | |

| | | | | | |
|--------|--------------------------|----------|----------|--|--------|
| レジメン | GEM療法 | | | 番号 | DBI-01 |
| 適応 | 胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第1,8,15日 | div(30分) | 4週1コース | |
| レジメン | GEM+S-1療法 | | | 番号 | DBI-03 |
| 適応 | 胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第1,8日 | div | 3週1コース *体表面積 | |
| S-1 | 65 mg/m ² *右記 | 第1~14日 | p.o. | 1.25 m ² 未満 60mg/日 1.25 m ² 以上~1.5 m ² 未満 80mg/日 1.5 m ² 以上 100mg/日 | |
| レジメン | GEM+CDDP療法 | | | 番号 | DBI-04 |
| 適応 | 胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第1,8日 | div | 3週1コース | |
| シスプラチン | 25 mg/m ² | 第1,8日 | div | | |
| レジメン | イミフィンジ+GEM+CDDP療法 | | | 番号 | DBI-05 |
| 適応 | 胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 第1日 | div | 3週1コース 8コースまで | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第1,8日 | div | 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg | |
| シスプラチン | 25 mg/m ² | 第1,8日 | div | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------------|---|------------------------------|---|--------|
| レジメン | イミフィンジ療法 | | | 番号 | DBI-06 |
| 適 応 | 胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース 体重30kg以下はイミフィンジ 20mg/kg | |
| レジメン | Pembro+GEM+CDDP 療法 | | | 番号 | DBI-07 |
| 適 応 | 胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 8 コースまで | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| シスプラチン | 25 mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| レジメン | Pembro+GEM 療法 | | | 番号 | DBI-08 |
| 適 応 | 胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| レジメン | 低用量 CDDP/5-FU 併用持続動注療法 (6 時間) | | | 番号 | DHC-01 |
| 適 応 | 肝細胞がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 10mg/body | 第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日 | 動注(1時間) 肝動脈留置 カテーテルより | 4 週 1 コース | |
| 5-FU | 250mg/body | 第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日 | 動注(5 時間) 肝動脈留置 カテーテルより | | |

| | | | | | |
|--------|--|---|-------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 低用量 CDDP/5-FU 併用持続動注療法 (24 時間) | | | 番号 | DHC-02 |
| 適 応 | 肝細胞がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 10mg/body | 第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日 | 動注(1時間) 肝動脈留置 カテーテルより | 4 週 1 コース | |
| 5-FU | 500mg/body | 第 1～5 日 第 8～12 日 第 15～19 日 第 22～26 日 | 動注(23 時間) 肝動脈留置 カテーテルより | | |
| レジメン | RAM 療法 | | | 番号 | DHC-03 |
| 適 応 | がん化学療法後に増悪した血清 AFP 値が 400ng/mL 以上の切除不能な肝細胞がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| サイラムザ | 8mg/kg | 第 1 日 | 初回 60 分 2 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| レジメン | Atezo+Bev 併用療法 | | | 番号 | DHC-04 |
| 適 応 | 切除不能な肝細胞がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テセントリク | 1200mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| アバスチン | 15mg/kg | 第 1 日 | div | | |

《脳神経外科》

| | | | | | |
|----------|-------------------------|--------|----------------------------|--|--------|
| レジメン | ロイコボリン救援 MTX 大量療法 | | | 番号 | NML-01 |
| 適応 | 原発性中枢性悪性リンパ腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| メソトレキセート | 3.5g/m ² | 第2日 | div(4時間) | 10日～2週ごとに繰り返すことができる (3コースまで) | |
| ロイコボリン | 15mg/回 4時間毎に 1日6回 | 第3～6日 | iv (MTX投与終了 12時間後から) | | |
| レジメン | R-MTX 大量療法 | | | 番号 | NML-02 |
| 適応 | 中枢性悪性リンパ腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| リツキサン | 375mg/m ² | 第1日 | div | 2週1コース | |
| メソトレキセート | 3.5g/m ² | 第2日 | div(4時間) | | |
| ロイコボリン | 15mg/回 4時間毎に 1日6回 | 第3～6日 | iv (MTX投与終了 12時間後から) | | |
| レジメン | (2コース目以降)テモダール療法 | | | 番号 | NMG-01 |
| 適応 | 悪性神経膠腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テモダール | 150mg/m ² | 第1～5日 | Div(90分) | 4週1コース 2.5 mg/ml 150mg/m ² を1日1回5日間投与し、 23日間休薬。この28日を1コースとする。 次コースから1回 200mg/m ² に増量 することが出来る。 | |
| レジメン | (初回)テモダール療法 | | | 番号 | NMG-02 |
| 適応 | 悪性神経膠腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| テモダール | 75mg/m ² | 第1～42日 | Div(90分) | 放射線との併用にて75mg/m ² を1日1 回42日間投与し、4週間休薬。 | |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|--------------------|--|--|--------|
| レジメン | Bev 療法(bi-weekly) | | | 番号 | NMG-03 |
| 適 応 | 悪性神経膠腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスチン | 10mg/kg | 第 1 日 | Div 30 分 | 2 週 1 コース | |
| レジメン | 放射線併用テモダール+Bev 療法 | | | 番号 | NMG-04 |
| 適 応 | 悪性神経膠腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスチン | 10mg/kg | 第 1.15. 29.42 日 | Div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | 42 日 1 コース 内服不可の場合はテモダール div 使用 テモダールとアバスチンの初回投 与日と最終投与日は同日とする | |
| テモダール | 75mg/m ² | 第 1~42 日 | p.o. | テモダールは放射線療法の終了 が延期される場合最大 49 日継続 投与可 | |
| レジメン | (初発維持)テモダール+Bev 療法 | | | 番号 | NMG-05 |
| 適 応 | 悪性神経膠腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスチン | 10mg/kg | 第 1.15 日 | Div 30 分 | 28 日 1 コース 6 コースまで | |
| テモダール | 150~ 200mg/m ² | 第 1~5 日 | p.o. | 内服不可の場合はテモダール div 使用 テモダールは 1 コース目は 150mg/m ² 、2 コース目以降忍容 性が確認される場合 200mg/m ² に 増量可 | |

| | | | | | |
|-------|--------------------|-------|-------------|--------------------------|--------|
| レジメン | Bev 療法(tri-weekly) | | | 番号 | NMG-06 |
| 適 応 | 悪性神経膠腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスチン | 15mg/kg | 第 1 日 | Div 30 分 | 21 日 1 コース | |

《腫瘍内科》

| | | | | | |
|---------|---------------------------|------------|------|---|--------|
| レジメン | ドキシル+CBDCA 療法 | | | 番号 | OOV-01 |
| 適 応 | 再発卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドキシル | 30mg/m ² | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC6 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | Dose dense TC 療法 | | | 番号 | OOV-02 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | TC 脱感作療法 (CBDCA 過敏反応既往患者) | | | 番号 | OOV-03 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍→ 100 倍→10 倍→原液 | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 2 日 | div | | |
| レジメン | wTC 療法 | | | 番号 | OOV-04 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC6 2×(Ccr+25)mg | 第 1,8,15 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|--|---------|------|---|--------|
| レジメン | CBDCA+GEM 療法 | | | 番号 | OOV-05 |
| 適 応 | 再発卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1.8 日 | div | 3 週 1 コース | |
| カルボプラチン | AUC4 4×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | CBDCA+GEM+Bev 療法 | | | 番号 | OOV-06 |
| 適 応 | 再発卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1.8 日 | div | | |
| カルボプラチン | AUC4 4×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | CBDCA 脱感作+GEM 療法 (CBDCA 過敏反応既往患者) | | | 番号 | OOV-07 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1.8 日 | div | 3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍→ 100 倍→10 倍→原液 | |
| カルボプラチン | AUC4 4×(GFR+25)mg | 第 2 日 | div | | |
| レジメン | CBDCA 脱感作+GEM+Bev 療法 (CBDCA 過敏反応既往患者) | | | 番号 | OOV-08 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍→ 100 倍→10 倍→原液 | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1.8 日 | div | | |
| カルボプラチン | AUC4 4×(GFR+25)mg | 第 2 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------|------------|------|--|--------|
| レジメン | TC 脱感作+Bev 療法 (CBDCA 過敏反応既往患者) | | | 番号 | OOV-09 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 175mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍→ 100 倍→10 倍→原液 6 コースまで | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div | | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 2 日 | div | | |
| レジメン | CBDCA 脱感作+Bev 療法 (CBDCA 過敏反応既往患者) | | | 番号 | OOV-10 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍→ 100 倍→10 倍→原液 6 コースまで | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | wTC 脱感作療法 (CBDCA 過敏反応既往患者) | | | 番号 | OOV-11 |
| 適 応 | 卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 3 週 1 コース カルボプラチン 1000 倍→ 100 倍→10 倍→原液 | |
| カルボプラチン | AUC5 2×(GFR+25)mg | 第 2,9,16 日 | div | | |
| レジメン | ノギテカン単独療法 | | | 番号 | OOV-12 |
| 適 応 | プラチナ抵抗性再発卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ハイカムチン | 1.5mg/m ² | 第 1~5 日 | div | 3 週 1 コース 1 段階減量 →1.25mg/m ² 2 段階減量 →1.0mg/m ² | |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--------|
| レジメン | ノギテカン+Bev 療法 | | | 番号 | OOV-13 |
| 適 応 | プラチナ抵抗性再発卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ハイカムチン | 1.5mg/m ² | 第1～5日 | div | 3週1コース | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第1日 | Div 初回90分、 2回目60分、 3回目以降30分 | 1段階減量 →1.25mg/m ² 2段階減量 →1.0mg/m ² | |
| レジメン | GEM+Bev 療法 | | | 番号 | OOV-14 |
| 適 応 | 再発卵巣がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベバシズマブ | 15mg/kg | 第1日 | div | 3週1コース | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第1.8日 | div | | |
| レジメン | PER+HER+PTX 療法 | | | 番号 | OBR-01 |
| 適 応 | 進行再発・切除不能乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パージェタ | 840mg/body(初回のみ) 420mg/body(2回目以降) | 第1日 | div | 3週1コース | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg(初回のみ) 6mg/kg(2回目以降) | 第1日 | div | | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第1.8.15日 | div | | |
| レジメン | Ipi 療法 | | | 番号 | OMM-01 |
| 適 応 | 悪性黒色腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ヤーボイ | 3mg/kg | 第1日 | div | 3週1コース 4コースまで | |

| | | | | | |
|----------|---|---------|--------|--|--------|
| レジメン | Nivo+Ipi 療法 | | | 番号 | OMM-02 |
| 適 応 | 悪性黒色腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 80mg/body | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ヤーボイ | 3mg/kg | 第 1 日 | div | 4 コースまで | |
| レジメン | Nivo 療法 | | | 番号 | OMM-03 |
| 適 応 | 悪性黒色腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オプジーボ | 240mg/body | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース | |
| レジメン | MTX 髄注療法 | | | 番号 | OME-01 |
| 適 応 | がん性髄膜炎 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| メソトレキセート | 10mg/body | 第 1 日 | 髄注 | 3 日 2 回/週×4 週 1 回/週×4~8 週 1 回/2 週 | |
| レジメン | CDDP+5-FU+セツキシマブ療法 | | | 番号 | OHN-02 |
| 適 応 | 頭頸部がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 400mg/m ² (初回のみ) 250mg/m ² (2回目以降) | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 6 コースまで | |
| 5-FU | 1000mg/m ² | 第 1-4 日 | div | 6 コース終了後はセツキシマブのみ | |
| シスプラチン | 100mg/ m ² | 第 1 日 | Div 側管 | | |
| レジメン | CDDP 3 週ごと+放射線療法 | | | 番号 | OHN-03 |
| 適 応 | 頭頸部がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 100mg/ m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |

| | | | | | |
|--------|----------------------|-----|---------|--------------------------|--------|
| レジメン | CDDP 毎週+放射線療法 | | | 番号 | OHN-04 |
| 適応 | 頭頸部がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 40mg/ m ² | 第1日 | div | 1週1コース | |
| レジメン | Pembro 療法 (3週間ごと) | | | 番号 | MSH-01 |
| 適応 | MSI-H 腫瘍 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 200mg/body | 第1日 | Div 30分 | 3週1コース | |
| レジメン | Nivo+Ipi 療法 | | | 番号 | MSH-02 |
| 適応 | MSI-High を有する結腸・直腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 240mg/body | 第1日 | div | 3週1コース | |
| ヤーボイ | 1mg/kg | 第1日 | div | 4コースまで 以後は Nivo 単独療法 | |
| レジメン | Nivo 療法 (2週間ごと) | | | 番号 | MSH-03 |
| 適応 | MSI-High を有する結腸・直腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 240mg/body | 第1日 | div | 2週1コース | |
| レジメン | Nivo 療法 (4週間ごと) | | | 番号 | MSH-04 |
| 適応 | MSI-High を有する結腸・直腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 480mg/body | 第1日 | div | 4週1コース | |
| レジメン | Pembro 療法 (6週間ごと) | | | 番号 | MSH-05 |
| 適応 | MSI-H 腫瘍 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| キイトルーダ | 400mg/body | 第1日 | Div 30分 | 6週1コース | |

| | | | | | |
|--------|---|-------------|------|--|--------|
| レジメン | CHOP 療法 | | | 番号 | ONH-01 |
| 適 応 | 非ホジキンリンパ腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アドリアシン | 50mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 計 6~8 コース オンコビン 1 日 2mg まで アドリアシン 生涯投与量 500mg/m ² まで | |
| エンドキサン | 750mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| オンコビン | 1.4mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| プレドニン | 40or60mg/m ² (or100mg/body) | 第 1~5 日 | p.o. | | |
| レジメン | R-CHOP 療法 | | | 番号 | ONH-02 |
| 適 応 | 非ホジキンリンパ腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| リツキサン | 375mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 計 6~8 コース オンコビン 1 日 2mg まで アドリアシン 生涯投与量 500mg/m ² まで | |
| アドリアシン | 50mg/m ² | 第 1 または 2 日 | div | | |
| エンドキサン | 750mg/m ² | 第 1 または 2 日 | div | | |
| オンコビン | 1.4mg/m ² | 第 1 または 2 日 | div | | |
| プレドニン | 40or60mg/m ² (or100mg/body) | 第 1~5 日 | p.o. | | |
| レジメン | Rit 単独療法 | | | 番号 | ONH-03 |
| 適 応 | 非ホジキンリンパ腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| リツキサン | 375mg/m ² | 第 1 日 | div | 1 週 1 コース Max 8 コース | |

| | | | | | |
|----------|---|------------|----------------------------------|--|--------|
| レジメン | weekly PTX 療法 | | | 番号 | OHS-01 |
| 適 応 | 血管肉腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 80mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | weekly DOC 療法 | | | 番号 | OHS-02 |
| 適 応 | 血管肉腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 25mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | エンコラフェニブ+ビニメチニブ+Cet 療法 | | | 番号 | OCO-01 |
| 適 応 | がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 500mg/m ² | 第 1 日 | div 初回 2 時間 2 回目以降 1 時間 | 2 週 1 コース エンコラフェニブ減量方法 1 段階減量:225mg/日 2 段階減量:150mg/日 3 段階減量:投与中止 | |
| エンコラフェニブ | 300mg/日 | 第 1~14 日 | p.o. | ビニメチニブ減量方法 1 段階減量:30mg/回 1 日 2 回 | |
| ビニメチニブ | 45mg/回 1 日 2 回 | 第 1~14 日 | p.o. | 2 段階減量:15mg/回 1 日 2 回 3 段階減量:投与中止 | |

| | | | | | |
|----------|---|----------|---|--|--------|
| レジメン | エンコラフェニブ+Cet 療法 | | | 番号 | OCO-02 |
| 適 応 | がん化学療法後に増悪した BRAF 遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 500mg/m ² | 第 1 日 | div 初回 2 時間 2 回目以降 1 時間 | 2 週 1 コース エンコラフェニブ減量方法 1 段階減量:225mg/日 2 段階減量:150mg/日 3 段階減量:投与中止 | |
| エンコラフェニブ | 300mg/日 | 第 1~14 日 | p.o. | | |
| レジメン | IRIS+Bev 療法 | | | 番号 | OCO-03 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80~120mg/日 | 第 1~14 日 | p.o. | 4 週 1 コース | |
| ベバシズマブ | 5mg/kg | 第 1,15 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | | |
| トポテシン | 125mg/m ² | 第 1,15 日 | div 2 時間 | | |
| レジメン | CAPIRI+Bev 療法 | | | 番号 | OCO-04 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カペシタビン | 1600mg/ m ² / 分 2 | 第 1~14 日 | p.o. | 3 週 1 コース | |
| ベバシズマブ | 7.5mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | | |
| トポテシン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 90 分 | | |

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | SOX (100) +HER 療法 | | | 番号 | OST-01 |
| 適 応 | HER2 陽性治癒切除不能・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg (初回のみ) 6mg/kg (2回目以降) | 第1日 | div 初回 90分 2回目以降 30分 | 3週1コース | |
| オキサリプラチン | 100mg/m ² | 第1日 | div 2時間 | | |
| S-1 | 80~120mg/日 | 第1~14日 | p.o. | | |
| レジメン | Nivo 療法 (4週間ごと) | | | 番号 | OST-02 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オブジーボ | 480mg/body | 第1日 | div | 4週1コース | |
| レジメン | 胃がん HER+FOLFOX 療法 | | | 番号 | OST-03 |
| 適 応 | HER2 陽性治癒切除不能・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トラスツズマブ | 8mg/kg (初回のみ) 6mg/kg (2回目以降) | 第1、22日 | div | 6週1コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第1、15、29日 | div | | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第1、15、29日 | div | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第1、15、29日 | div | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第1、15、29日 | 46時間持続静注 | | |

| | | | | | |
|--------|---------------|-------|------|--|--------|
| レジメン | イミフィンジ療法 | | | 番号 | OHC-01 |
| 適 応 | 切除不能な肝細胞がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg | |
| レジメン | イミフィンジ+イジユド療法 | | | 番号 | OHC-02 |
| 適 応 | 切除不能な肝細胞がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イミフィンジ | 1500mg/body | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| イジユド | 300mg/body | 第 1 日 | div | イジユド併用は初回 1 コース のみ 体重 30kg 以下はイミフィンジ 20mg/kg、イジユド 4 mg/kg | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|---------|------|---|--------|
| レジメン | アドリアマイシン(ドキシソルビシン)療法 | | | 番号 | OSS-01 |
| 適 応 | 軟部肉腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アドリアシン | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース アドリアシン 生涯投与量 500mg/m ² まで | |
| レジメン | GEM+CDDP+S-1 療法 | | | 番号 | OBI-01 |
| 適 応 | 切除不能・再発胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 25mg/m ² | 第 1 日 | div | 2 週 1 コース | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| S-1 | 80 mg/m ² | 第 1-7 日 | p.o. | | |

(参考)血管外漏出時の組織障害性に基づく分類

下線_____は院内採用

| 壊死性抗がん剤 vesicant drugs | 炎症性抗がん剤 irritant drugs | | 非壊死性抗がん剤 non-vesicant drugs |
|--|---|--|--|
| 抗腫瘍性抗生物質 アクチノマイシンD (コスメゲン) アムルピシン (カルセド) イダルピシン (イダマイシン) エピルピシン (エピルピシン) ダウノルピシン (ダウノマイシン) ドキソルピシン (アドリアシン) ピラルピシン (ピノルビン) マイトマイシンC (マイトマイシン) 抗腫瘍性植物成分 ドセタキセル (ドセタキセル) パクリタキセル (パクリタキセル) パクリタキセル (アブラキサン) ビノレルビン (ロゼウス) ビンクリスチン (オンコビン) ビンデシン (フィルデシン) ビンブラスチン (エクザール) アルキル化剤 ラニムスチン (サイメリン) その他の抗腫瘍剤 ミトキサントロン (ノバントロン) | 抗腫瘍性抗生物質 アクラルピシン (アクラシノン) 塩酸ドキソルピシン (ドキシル) 抗腫瘍性植物製剤 イリノテカン (トポテシン) イリノテカン (オニバイド) エトポシド (エトポシド) ノギテカン (ハイカムチン) アルキル化剤 イホスファミド (イホマイド) カルボコン (エスキノン) シクロホスファミド (エンドキサン) ダカルバジン (ダカルバジン) チオテパ (テスパミン) テモゾロミド (テモダール) カバジタキセル (ジェブタナ) 白金錯体製剤 カルボプラチン (カルボプラチン) シスプラチン (シスプラチン) ネダプラチン (アクプラ) オキサリプラチン (オキサリプラチン) 代謝拮抗剤 ゲムシタビン (ゲムシタビン) フルオロウラシル (5-FU) 分子標的薬 トラスツズマブ エムタ ンシン (カドサイラ) | 抗腫瘍性植物製剤・分子標的薬配合体 トラスツズマブ デルク ステカン (エンハーツ) | 抗腫瘍性抗生物質 プレオマイシン (プレオ) ペプロマイシン (ペプレオ) アルキル化剤 ニムスチン (ニドラン) 代謝拮抗剤 エノシタビン (サンラビン) シタラビン (キロサイド) メトトレキサート (メソトレキセート) ペメトレキセド (ペメトレキセド) 酵素製剤 アスバラギナーゼ (ロイナーゼ) インターフェロン インターロイキン 分子標的薬 ベバシズマブ (アバスチン・ベバシズマブ) トラスツズマブ (トラスツズマブ) リツキシマブ (リツキシサン) セツキシマブ (アービタックス) パニツムマブ (ベクティビックス) ペルツズマブ (パージェタ) ラムシルマブ (サイラムザ) ニボルマブ (オプジーボ) イピリムマブ (ヤーボイ) ペムブロリズマブ (キイトルーダ) アテゾリズマブ (テセントリク) デュルバルマブ (イミフィンジ) アベルマブ (バベンチオ) 微小管阻害薬 エリブリンメシル酸塩 (エリブリン) |

分類不明抗がん剤

- ・テムシロリムス(トーリセル)
- ・エンホルツマブ ベドチン (パドセブ) →適正使用ガイド参照

血管外漏出時の対応

血管外漏出

抗がん薬では、血管外に漏出した際に壊死を起しやすいため、壊死起因性抗がん薬から壊死を起す可能性が低い非壊死性抗がん薬まで、その危険度は表のようにさまざまである。

ただし、非壊死性抗がん薬でも大量に漏出すれば局所壊死を起し得る。漏出の際には迅速かつ適切に対処するが、その前に、血管外漏出を起ささないように工夫し、注意喚起することがより重要である。

表 血管外漏出時の組織障害性に基づく抗がん薬の分類

| 壊死起因性抗がん薬 | 炎症性抗がん薬 | 非壊死性抗がん薬 |
|-----------------|-----------|-------------|
| ドキシソルビン | アクリルビン | エノシタビン |
| ドキシソルビンリポソーム製剤 | イリノテカン | シタラビン |
| イダルビシン | エトポシド | フルダラビン |
| エピルビシン | ギテカン | ベメトレキセド |
| ダウノルビン | オキサリプラチン | プレオマイシン |
| ピラルビシン | カルボプラチン | ペプロマイシン |
| アムルビシン | シスプラチン | エリブリン |
| ミトキサントロン | ネダプラチン | ボルテゾミブ |
| カバジタキセル | イホスファミド | インターフェロン製剤 |
| ドセタキセル | シクロホスファミド | インターロイキン製剤 |
| パクリタキセル | テモゾロミド | モノクローナル抗体製剤 |
| アルブミン懸濁型パクリタキセル | ダカルバジン | |
| ビノレルビン | プスルファン | |
| ビンクリスチン | ベンダムスチン | |
| ビンデシン | メルファラン | |
| ビンプラスチン | ゲムシタビン | |
| ラニムスチン | フルオウラシル | |
| ニムスチン | フルダラビン | |
| トラベクテジン | メトトレキサート | |


予防法

- ①レジメンの変更が可能な場合、より短時間で投与する
- ②表在静脈が萎縮している場合は事前に腕を温め血管を拡張させる
- ③可能であれば、肘と手首の中間付近に点滴ルートを確認する
- ④留置針を使用し、漏れのないことを確認する

血管外漏出の危険性や初期症状について患者に説明し、点滴ルートを引っ張ったり体の下に敷かないよう注意を促し局所の違和感があればすぐにスタッフに伝えるように指導する。

血管外に漏出した際の対処

血管外に漏出した際には医師および看護師とのコミュニケーションを十分にとり、適切かつ迅速に対処することが必要である。まずは保存的治療を行うが、それができなければ外科的治療(手術)を行うことになる。漏出した抗がん薬の種類や局所の症状に応じて、皮膚科への受診を早期に検討する。



ステロイド外用剤の塗布
strongestのステロイド外用剤(例えばデルモベート軟膏)を1日2回塗布する。擦り込まず、軽く塗布する。



図 スтероイド剤の局注範囲

*: アントラサイクリン系が漏出した場合、テクスラゾキサンの投与を検討する, : 必要に応じて検討

- ◇漏出患部の冷却および加温について：多くの抗がん薬では患部の冷却が推奨されているが、ビンカアルカロイド系などでは加温が推奨されている。
- ◇ステロイド局注について：デキサメタゾンおよびベクロメタゾン(4～8mg)、プレドニゾロン(50～100mg)、ヒドロコルチゾン(100～200mg)などのステロイドを、図のように漏出部位よりやや広範囲に局注する。疼痛緩和のために局所麻酔薬で総量約5～10mLに希釈することもある。

図5 血管外漏出の副作用対策シート

中止レジメン

<呼吸器科>

| | | | | | |
|---------|--------------------------|---------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | CAV-Ⅱ | | | 番号 | RLC-09 |
| 適 応 | SCLC | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 100mg | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| エトポシド | 100mg | 第 1-5 日 | div | | |
| アドリアシン | 30mg | 第 1 日 | iv | | |
| フィルデシン | 3mg | 第 1 日 | iv | | |
| レジメン | CBDCA+DOC 療法 | | | 番号 | RLC-13 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC4~6 4~6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | CBDCA+GEM 療法 | | | 番号 | RLC-14 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|----------------------------|----------|--|--------------------------|--------|
| レジメン | GEM+S-1 療法 | | | 番号 | RLC-17 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ジェムザール | 1000mg/m ² | 第 8,15 日 | div | 3 週 1 コース | |
| S-1 | 60mg/m ² | 第 1~14 日 | po | | |
| レジメン | CBDCA+GEM+アバスチン療法 | | | 番号 | RLC-19 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5~6 5~6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 4~6 コース | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| アバスチン | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |
| レジメン | CBDCA+TXT+アバスチン | | | 番号 | RLC-20 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 最大 6 コース | |
| タキソテール | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| アバスチン | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---------|--|--------------------------|--------|
| レジメン | CDDP+TXT+アバスチン | | | 番号 | RLC-21 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| タキソテール | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3~6 コース | |
| アバスチン | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |
| レジメン | CDDP+NVB+アバスチン | | | 番号 | RLC-22 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ナベルビン | 25mg/m ² | 第 1,8 日 | div | 3~6 コース | |
| アバスチン | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |
| レジメン | TXT+アバスチン | | | 番号 | RLC-23 |
| 適 応 | 扁平上皮がんを除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| タキソテール | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| アバスチン | 15mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | | |

| | | | | | |
|---------|--------------------------|------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | PTX 単剤療法 | | | 番号 | RLC-01 |
| 適 応 | 小細胞肺がん/非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| パクリタキセル | 60~70mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | CPT-11 単剤療法 | | | 番号 | RLC-02 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 100mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | GEM 単剤療法 | | | 番号 | RLC-04 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| レジメン | CBDCA+ PTX weekly 療法 | | | 番号 | RLC-06 |
| 適 応 | 小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC4~6 4~6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース | |
| パクリタキセル | 70mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | | |
| レジメン | CDDP+DOC 療法 | | | 番号 | RLC-12 |
| 適 応 | 非小細胞肺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ドセタキセル | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------|----------|------|---------------------------------------|--------|
| レジメン | CBDCA+CPT-11 療法 | | | 番号 | RLC-16 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(Ccr+25)mg | 第1日 | div | 4週1コース | |
| トポテシン | 60mg/m ² | 第1,8,15日 | div | | |
| レジメン | CDDP+S-1 と同時胸部放射線療法 | | | 番号 | RLC-26 |
| 適 応 | 局所進行非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 60mg/m ² | 第1日 | div | 4週1コース | |
| S-1 | 80mg/m ² | 第1~14日 | p.o. | 4~6コース 放射線治療: 1回2 Gy 週5日 計60 Gy | |
| レジメン | CDDP+GEM 療法 | | | 番号 | RLC-32 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第1日 | div | 3週1コース | |
| ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 第1,8日 | div | | |
| レジメン | CDDP+CPT-11 療法 | | | 番号 | RLC-38 |
| 適 応 | 非小細胞肺癌 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 80mg/m ² | 第1日 | div | 4週1コース | |
| トポテシン | 60mg/m ² | 第1,8,15日 | div | | |

<泌尿器科>

| | | | | | |
|---------|--------------------------|----------------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | DEC 療法 | | | 番号 | UPC-01 |
| 適 応 | 進行性前立腺がん(ホルモン抵抗性) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC6 6×(Ccr+25)mg | 第 1 日 | div | 4 週 1 コース 効果ある時継続投与 | |
| タキソテール | 40mg | 第 1,8,15,22 日 | div | | |
| エストラサイト | 3~4cap | 連日 | p.o. | | |
| レジメン | GCD 療法 | | | 番号 | UBC-03 |
| 適 応 | 尿路上皮がん [保険適応なし] | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | 300mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 効果ある時継続投与 | |
| ジェムザール | 1000mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| タキソテール | 30mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| レジメン | GD 療法 | | | 番号 | UBC-04 |
| 適 応 | 浸潤性膀胱がん(尿路上皮がん) [保険適応なし] | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ジェムザール | 800mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div | 4 週 1 コース 2~4 コース | |
| タキソテール | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | DP 療法(weekly) | | | 番号 | UPC-03 |
| 適 応 | ホルモン抵抗性前立腺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| タキソテール | 30mg/m ² | 第 1,8, 15,22,29 日 | div | 6 週 1 コース | |
| プレドニン | 10mg/日(分 2) | 第 1~42 日 | po | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------|-------------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | イムネース投与療法(IL-2) | | | 番号 | UKC-01 |
| 適 応 | 腎がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| イムネース | 70 万単位/body | 第 1,3,5 日 | div | 週3回連続投与 最低 6 ヶ月 | |
| レジメン | トーリセル単剤療法 | | | 番号 | UKC-02 |
| 適 応 | 進行・転移性腎がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トーリセル | 25 mg/body | 第 1 日 | div | 1 週毎繰り返し | |
| レジメン | MPB 療法 | | | 番号 | UPE-01 |
| 適 応 | 陰茎がん [保険適応なし] | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 20mg/m ² | 第 2-6 日 | div | 28 日 1 コース | |
| メソトレキセート | 200mg/m ² | 第 1,15,22 日 | div | | |
| ブレオ | 10mg/m ² | 第 2-6 日 | div | | |
| レジメン | 低用量 DP 療法 | | | 番号 | UPC-04 |
| 適 応 | ホルモン抵抗性前立腺がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| タキソテール | 30mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| プレドニン | 10mg/日(分 2) | 第 1~21 日 | po | | |

<消化器内科>

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---------------------|--|--------------------------|---------|
| レジメン | I-LV+5FU(RPMI)療法 | | | 番号 | ◎DCO-01 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アインボリン | 250mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div(2 時間) | 8 週 1 コース | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div(全開) | | |
| レジメン | GEM 腹腔内投与 | | | 番号 | DPA-03 |
| 適 応 | 膵がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ジェムザール | 500mg/m ² | 第 1,8,15 日 | 腹腔内投与 | 4 週 1 コース | |
| レジメン | GEM 腹腔内投与 | | | 番号 | DBI-02 |
| 適 応 | 胆道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ジェムザール | 500mg/m ² | 第 1,8,15 日 | 腹腔内投与 | 4 週 1 コース | |
| レジメン | mFOLFOX6+bevacizumab 療法 二次治療 | | | 番号 | DCO-07 |
| 適 応 | 切除不能・転移性進行大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスタチン | 10mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分、 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| アインボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------|
| レジメン | FOLFIRI+bevacizumab 療法 二次治療 | | | 番号 | DCO-09 |
| 適 応 | 大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスタチン | 10mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分、3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div(2 時間) | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1 日 | 46 時間持続静注 | | |
| レジメン | MMC+5-FU+RT 療法 | | | 番号 | DAN-01 |
| 適 応 | 肛門がん(扁平上皮がん) | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| マイトマイシン | 10mg/m ² | 第 1,29 日 | iv | RT は 5 日/週を 6 週間 1 コースで終了 | |
| 5-FU | 800mg/m ² | 第 1~4 日 第 29~32 日 | div(24 時間) | | |

<外科>

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|------------|-----------------|------------------------------|--------|
| レジメン | 乳がん AC 療法 | | | 番号 | SBR-02 |
| 適 応 | 術後補助化学療法 転移・進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アドリアシン | 40～60mg/m ² | 第 1 日 | div | 3～4 週 1 コース 術後補助の場合 4 コース | |
| エンドキサン | 500～600mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | 乳がん PAC 療法 | | | 番号 | SBR-05 |
| 適 応 | 転移・進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| タキソール | 175～210mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| レジメン | 乳がん VNB+HER 療法 | | | 番号 | SBR-08 |
| 適 応 | 進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ハーセプチン | 4mg/kg(初回のみ) 2mg/kg(2回目以降) | 第 1,8,15 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ナベルピン | 25mg/m ² | 第 1,8 日 | div (側管から全開) | | |
| レジメン | 乳がん HER 療法 | | | 番号 | SBR-09 |
| 適 応 | 進行・転移・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ハーセプチン | 4mg/kg(初回のみ) 2mg/kg(2回目以降) | 第 1 日 | div | 毎週繰り返し 1 週 1 コース | |
| レジメン | 乳がん weekly PAC+HER 療法 | | | 番号 | SBR-10 |
| 適 応 | 進行・転移・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| タキソール | 80mg/m ² | 第 1 日 | div | 毎週繰り返し 1 週 1 コース | |
| ハーセプチン | 4mg/kg(初回のみ) 2mg/kg(2回目以降) | 第 1 日 | div | | |

| | | | | | |
|--------|--------------------------------|---------------|-------------|--|--------|
| レジメン | 乳がん DOC+HER 療法 | | | 番号 | SBR-11 |
| 適 応 | 進行・転移・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ドセタキセル | 75mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース | |
| ハーセプチン | 4mg/kg(初回のみ) 2mg/kg(2 回目以降) | 第 1,8,15 日 | div | | |
| レジメン | 乳がん CAF 療法 | | | 番号 | SBR-13 |
| 適 応 | 術後補助化学療法、転移・進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アドリアシン | 50mg/m ² | 第 1 日 | div | 3 週 1 コース 6 コース繰り返す | |
| エンドキサン | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| 5FU | 500mg/m ² | 第 1,8 日 | div | | |
| レジメン | 乳がん HER+S-1 療法 | | | 番号 | SBR-14 |
| 適 応 | 進行・再発・転移性乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ハーセプチン | 4mg/kg(初回のみ) 2mg/kg(2 回目以降) | 第 1,8,15,22 日 | div | HER:4 週投与 1 週休薬 *S-1:①4 週投与 2 週休薬 ②2 週投与 1 週休薬 (③隔日投与も可) 体表面積 1.25 m ² 未満 40mg/回 1.25 m ² 以上～1.5 m ² 未満 50mg/回 1.5 m ² 以上 60mg/回 | |
| S-1 | *右記 | | po(1 日 2 回) | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|-------------|----------|---|--------|
| レジメン | 乳がん HER+カペシタビン療法 | | | 番号 | SBR-15 |
| 適応 | 進行・再発・転移性乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ハーセプチン | 4mg/kg(初回のみ) 2mg/kg(2回目以降) | 第1,8,15,22日 | div(2時間) | HER:毎週 ゼローダ:3週投与 | |
| ゼローダ | *右記 | 第1~21日 | po(1日2回) | 1週休薬 *体表面積 1.31㎡未満 900mg/回 1.31㎡以上~1.64㎡未満 1200mg/回 1.64㎡以上 1500mg/回 | |
| レジメン | 乳がん GEM+HER療法 | | | 番号 | SBR-18 |
| 適応 | 切除不能・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ゲムシタビン | 1250mg/㎡ | 第1,8日 | div | 3週1コース 繰り返し | |
| ハーセプチン | 4mg/kg(初回のみ) 2mg/kg(2回目以降) | 第1,8,15日 | div | | |
| レジメン | 乳がん アブラキサン+HER療法 | | | 番号 | SBR-20 |
| 適応 | 手術不能・進行・再発乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ハーセプチン | 4mg/kg(初回のみ) 2mg/kg(2回目以降) | 第1,8,15日 | div | 3週1コース | |
| アブラキサン | 260mg/㎡ | 第1日 | div | | |
| レジメン | 乳がん HER+エリブリン bi-weekly療法 | | | 番号 | SBR-34 |
| 適応 | 切除不能・進行再発・転移性乳がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| エリブリン | 1.4mg/㎡ | 第1日 | div | 2週1コース エリブリン | |
| ハーセプチン | 4mg/kg(初回のみ) 2mg/kg(2回目以降) | 第1,8日 | div | 減量時の投与量 1.4mg/㎡ → 1.1mg/㎡ → 0.7mg/㎡ → 中止 | |

| | | | | | |
|-------|-------------------------|-------|------|--------------------------|--------|
| レジメン | 食道がん nedaplatin 療法 | | | 番号 | SES-04 |
| 適 応 | 転移・進行・再発食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アクプラ | 80~100mg/m ² | 第1日 | div | 5週1コース | |
| レジメン | 食道がん nedaplatin+5FU 療法 | | | 番号 | SES-05 |
| 適 応 | 食道がん術後、肝転移 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アクプラ | 5mg | 第1~5日 | div | 1週1コース | |
| 5-FU | 250mg | 第1~7日 | iv | 2コース | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 食道がん nedaplatin+5FU 低用量療法 | | | 番号 | SES-06 |
| 適 応 | 食道がん術後、肝転移 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アクプラ | 5mg/m ² | 第1～5日 | div | 1週1コース | |
| 5-FU | 250mg/m ² | 第1～5日 | div | | |
| レジメン | 食道がん nedaplatin+5FU 低用量療法Ⅱ | | | 番号 | SES-07 |
| 適 応 | 食道がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アクプラ | 10mg | 第1～5日 | div | 1週1コース | |
| 5-FU | 250mg | 第1～5日 | div | | |
| レジメン | 胃がん CDDP+5FU 低用量療法 | | | 番号 | SST-02 |
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 10mg/m ² | 第1日 | div | 4週1コース | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第1～5日 | div | | |
| レジメン | 胃がん CDDP+5FU 継続低用量療法 | | | 番号 | SST-11 |
| 適 応 | 胃がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 10mg/Body | 第1～5,8～12日 | div | 2週1コース | |
| 5-FU | 500mg/Body | 第1～5,8～12日 | div | | |
| アイソボリン | 250mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div | 8週1コース | |
| 5FU | 600mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div (全開) | | |
| レジメン | 胃がん 5FU+I-LV 療法 | | | 番号 | SST-06 |

| | | | | |
|--------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| 適 応 | 切除不能 転移・再発胃がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| アイソボリン | 250mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div | 8 週 1 コース |
| 5FU | 600mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div (全開) | |
| レジメン | 大腸がん CPT-11+5FU+I-LV(IFL)療法 | | 番号 | ◎SCO-01 |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| トポテシン | 100mg/m ² | 第 1,8 日 | div | 3 週 1 コース |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1,8 日 | iv | |
| アイソボリン | 10mg/m ² | 第 1,8 日 | div | |
| レジメン | 大腸がん I-LV+5FU(RPMI)療法 | | 番号 | ◎SCO-02 |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| アイソボリン | 250mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | div | 8 週 1 コース |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,8,15,22,29,36 日 | iv | |
| レジメン | 大腸がん CPT-11 変法療法 | | 番号 | SCO-04 |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| トポテシン | 100mg/m ² | 第 1,15 日 | div | 4 週 1 コース |

| | | | | | |
|----------|----------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん FOLFOX4 療法 | | | 番号 | SCO-05 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん 直腸がんにおける術後補助化学療法 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,2 日 | div 22 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がん FOLFOX4 変法療法 | | | 番号 | SCO-06 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん 直腸がんにおける術後補助化学療法 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 300mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん FOLFIRI 療法 | | | 番号 | SCO-07 |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1～3 日 | div 46 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がん FOLFIRI 変法療法 | | | 番号 | SCO-08 |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | 2 週 1 コース | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div (全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| 5-FU | 1000mg/m ² | 第 2 日 | div 4 時間 | | |

| | | | | | |
|--------|------------------------------|---------|---|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+IFL 療法 | | | 番号 | SCO-09 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 100mg/m ² | 第 1,8 日 | div | 3 週 1 コース | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1,8 日 | div(iv) | | |
| アイソボリン | 10mg/m ² | 第 1,8 日 | div(iv) | | |
| アバスタチン | 5mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | | |
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+IFL 療法 二次治療 | | | 番号 | SCO-10 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 100mg/m ² | 第 1,8 日 | div | 3 週 1 コース | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1,8 日 | div(iv) | | |
| アイソボリン | 10mg/m ² | 第 1,8 日 | div(iv) | | |
| アバスタチン | 10mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | | |

| | | | | | |
|----------|----------------------------------|---------|---|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+FOLFOX4 療法 | | | 番号 | SCO-11 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスタチン | 5mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,2 日 | div 22 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+FOLFOX4 療法 二次治療 | | | 番号 | SCO-12 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスタチン | 10mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,2 日 | div 22 時間 前記 5-FU 投与後 | | |

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|---------|---|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+FOLFOX4 変法療法 | | | 番号 | SCO-13 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスタチン | 5mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div (全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 300mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+FOLFOX4 変法療法 二次治療 | | | 番号 | SCO-14 |
| 適 応 | 進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスタチン | 10mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第 1 日はオキサリプラチンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div (全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 300mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |

| | | | | | |
|--------|----------------------------------|---------|---|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+FOLFIRI 療法 | | | 番号 | SCO-15 |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスタチン | 5mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) アイソボリン 投与後 | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1～3 日 | div 46 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+FOLFIRI 療法 二次治療 | | | 番号 | SCO-16 |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスタチン | 10mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1～3 日 | div 46 時間 前記 5-FU 投与後 | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|-------|---|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+FOLFIRI 変法療法 | | | 番号 | SCO-19 |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスチン | 5mg/kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと 同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div (全開) アイソボリン 投与後 | | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| 5-FU | 1000mg/m ² | 第 2 日 | div 4 時間 | | |
| レジメン | 大腸がん bevacizumab+FOLFIRI 変法療法 | | | | |
| 適 応 | 切除不能 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アバスチン | 10mg/Kg | 第 1 日 | div 初回 90 分、 2 回目 60 分 3 回目以降 30 分 | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div (全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| 5-FU | 1000mg/m ² | 第 2 日 | div 4 時間 | | |

| | | | | | |
|----------|--|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がんアービタックス＋FOLFOX4 療法 | | | 番号 | SCO-24 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 400mg/m ² (初回のみ) 250mg/m ² (2回目以降) | 第 1,8 日 | div 初回 120 分 2回目以降 60 分 | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第1日はオキサリプラチン と同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,2 日 | div 22 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がんアービタックス＋FOLFOX4 変法療法 | | | 番号 | SCO-25 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 400mg/m ² (初回のみ) 250mg/m ² (2回目以降) | 第 1,8 日 | div 初回 120 分 2回目以降 60 分 | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第1日はオキサリプラチン と同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div (全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 300mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |

| | | | | | |
|---------|--|---------|----------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がんアービタックス＋FOLFIRI 療法 | | | 番号 | SCO-26 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 400mg/m ² (初回のみ) 250mg/m ² (2回目以降) | 第 1,8 日 | div (初回 120 分、2回目以降 60 分) | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1～3 日 | div 46 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がんアービタックス＋FOLFIRI 変法療法 | | | 番号 | SCO-27 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アービタックス | 400mg/m ² (初回のみ) 250mg/m ² (2回目以降) | 第 1,8 日 | div (初回 120 分、 2回目以降 60 分) | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div (全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| 5-FU | 1000mg/m ² | 第 2 日 | div 4 時間 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がんベクティビックス+FOLFOX4 療法 | | | 番号 | SCO-29 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベクティ ビックス | 6mg/kg | 第 1 日 | div 60 分 | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチ ン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第1日はオキサリプラチン と同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 600mg/m ² | 第 1,2 日 | div 22 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がんベクティビックス+FOLFOX4 変法療法 | | | 番号 | SCO-30 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベクティ ビックス | 6mg/kg | 第 1 日 | div 60 分 | 2 週 1 コース | |
| オキサリプラチ ン | 85mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 100mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 第1日はオキサリプラチン と同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1,2 日 | div (全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 300mg/m ² | 第 1,2 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がんベクティビックス+FOLFIRI 療法 | | | 番号 | SCO-31 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベクティ ビックス | 6mg/kg | 第 1 日 | div 60 分 | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div(全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 2400mg/m ² | 第 1～3 日 | div 46 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| レジメン | 大腸がんベクティビックス+FOLFIRI 変法療法 | | | 番号 | SCO-32 |
| 適 応 | 進行・転移・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| ベクティ ビックス | 6mg/kg | 第 1 日 | div 60 分 | 2 週 1 コース | |
| トポテシン | 150mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 | | |
| アイソボリン | 200mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 トポテシンと同時投与 | | |
| 5-FU | 400mg/m ² | 第 1 日 | div (全開) アイソボリン投与後 | | |
| 5-FU | 500mg/m ² | 第 1 日 | div 2 時間 前記 5-FU 投与後 | | |
| 5-FU | 1000mg/m ² | 第 2 日 | div 4 時間 | | |

| | | | | | |
|-------|----------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------|
| レジメン | 大腸がん IRIS+アバスチン療法 | | | 番号 | SCO-35 |
| 適 応 | 治癒切除不能な進行・再発大腸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| S-1 | 80~120mg/日 | 第1~14日 | p.o. | 4週1コース * | |
| アバスチン | 5mg/kg | 第1,15日 | div 初回90分、 2回目60分 3回目以降30分 | | |
| トポテシン | 125mg/m ² | 第1,15日 | div 2時間 | | |

<耳鼻科>

| | | | | | |
|--------|----------------------|-------|------|--|--------|
| レジメン | 照射併用化学療法その1 | | | | |
| 適 応 | 頭頸部がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| タキソテール | 10mg/50kg | 第1日 | div | ○照射中に週1回点滴静注 (原則として照射中は続行) ○「その2」以降もありえる | |
| レジメン | CDDP+5FU | | | | |
| 適 応 | 頭頸部がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 100mg/50kg | 第1日 | div | ○4週1コース ○コース数は症例により異なる | |
| 5FU | 1000mg/50kg | 第1-5日 | div | | |
| レジメン | 放射線併用 NDP+5FU 療法 | | | 番号 | OHN-01 |
| 適 応 | 頭頸部がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アクプラ | 100mg/m ² | 第1日 | div | ○4週1コース ○放射線照射中に2コース行う | |
| 5FU | 1000mg/body | 第1-5日 | div | | |

<産婦人科>

| | | | | | |
|----------|----------------------|------------|------------|--------------------------|--------|
| レジメン | CPT11+MMC 療法 | | | 番号 | GUT-05 |
| 適 応 | 進行・再発子宮頸がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| トポテシン | 100mg/m ² | 第 1,8,15 日 | div(120 分) | 4 週 1 コース | |
| マイトマイシン | 10mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | CAP 療法 | | | 番号 | GOV-07 |
| 適 応 | 卵巣がん、子宮内膜がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| カルボプラチン | AUC5 5×(GFR+25)mg | 第 1 日 | div | 3-4 週休薬 | |
| ファルモルビシン | 50mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| エンドキサン | 500mg/m ² | 第 1 日 | div | | |
| レジメン | PVP 療法 | | | 番号 | GUT-01 |
| 適 応 | 子宮頸部扁平上皮がん | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| シスプラチン | 60mg/m ² | 第 1 日 | div | 1-2 週休薬 | |
| エクザール | 4mg/m ² | 第 1,2 日 | div | | |
| ペブレオ | 10mg/body | 第 1,8,15 日 | 24 時間持続皮下注 | | |

<脳神経外科>

| | | | | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|------|---------------------------------------|
| レジメン | IAR 療法(初期療法) | | | |
| 適 応 | 膠芽腫、悪性星細胞腫 | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| 放射線 | 50～60Gy | 第 1 日より照射 | | |
| ニドラン | 80mg/m ² | 第 1,36 日 | iv | |
| フェロン | 200 万 IU/m ² | 第 3 日より 週 3 回、8 週間 | div | |
| レジメン | IAR 療法(維持療法) | | | |
| 適 応 | 膠芽腫、悪性星細胞腫 | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| A 群： ニドラン | 80mg/m ² | 6～8 週おき | iv | 初期療法終了後、実施 |
| B 群： ニドラン | 80mg/m ² | 6～8 週おき | iv | |
| フェロン | 200 万 IU/m ² | 1～2 週に 1 回 | div | |
| レジメン | フェロン+テモダール療法 [患者限定レジメン] | | | |
| 適 応 | 悪性神経膠腫再発 | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) |
| フェロン | 300 万単位 | 第 1 日 | Div | 28 日 1 コース 内服不可の場合はテモダール div 使用 |
| テモダール | 260mg/日 | 第 1～5 日 | p.o. | |

<血液内科>

| | | | | | |
|--------|----------------------|--------------------------|----------|--------------------------|-----|
| レジメン | ABVd 療法 | | | 番号 | HHL |
| 適 応 | ホジキンリンパ腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| アドリアシン | 25mg/m ² | 第 1,15 日 | div | 4 週 1 コース | |
| ブレオ | 10mg/m ² | 第 1,15 日 | div | | |
| エクザール | 6mg/m ² | 第 1,15 日 | div | | |
| ダカルバジン | 250mg/m ² | 第 1,15 日 | div | | |
| レジメン | VAD 療法 | | | | |
| 適 応 | 骨髄腫 | | | | |
| 投与薬剤名 | 投与量 | 投与日 | 投与方法 | 投与スケジュール (投与間隔、コース数等) | |
| オンコビン | 0.4mg | 第 1～4 日 | 24h 持続静注 | 4 週 1 コース | |
| アドリアシン | 9mg/m ² | 第 1～4 日 | 24h 持続静注 | | |
| デカドロン | 40mg | 第 1～4 9～12 17～20 日 | div | | |